




Waldökologische Standortskartierung

Regionallegende

Wuchsgebiet:	3	Schwarzwald
Einzelwuchsbezirk:	3/11	Hotzenwald
Zonalwald:		Montaner Buchen-Tannen-Wald, örtlich mit Fichte
Zonalwald:		Submontaner Buchen-Tannen-Wald mit Traubeneiche

Ausgabestand: 21.02.2024

Erklärung der Legendenzeilen



In grau dargestellte Standortseinheiten stammen aus Kartierungen die wiederholt werden müssen. Historische Regionale Standortseinheiten sind am 'his' im Sigel erkennbar. Diese Standortseinheiten sind veraltet und werden nicht mehr kartiert, sie besitzen keine Beschreibung der Zeilen.

Fachbearbeitung

Bei Fragen oder Nachbestellungen wenden Sie sich bitte an die:

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg

E-Mail: Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de
 Telefon: 0761 / 4018 – 0

Datenbank Management



Zasiusstr. 77
 79102 Freiburg
www.idama.de

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de
www.fva-bw.de

Datenquelle:


© Standortsdaten: Landesforstverwaltung BW

Hinweis: Bei den Standorten des kristallinen Grundgebirges haben sich die Böden weithin auf glazial und periglazial geprägten Schuttdecken gebildet. Deren kristalline Ausgangsgesteine umfassen Gneise, v.a. unterschiedliche Gneisanatexite, Metatexite und auch Paragneise sowie verschiedene Granite, Ganggranite, Granitporphyre, granitähnliche Gesteine und andere Ganggesteine. Zum kristallinen Grundgebirge zählt hier auch das grobkörnig verwitternde Rotliegende im Süden.

A. Standorte der ebenen und schwach geneigten Lagen

Öko-Serie der tiefgründigen grusigen Lehmböden

(Tiefgründige, meist steinarme lehmige Böden mit wechselndem Grus- und Sandgehalt, meist aus Gneisverwitterung; örtlich mit Schlufflehmvergütung im Oberboden)



Buchenwald auf frischem grusigem Lehmboden (submontan); Buchen-Tannen-Wald auf frischem grusigem Lehmboden (montan)

gL+

blaßd'braun
d'grüne Querstrichelung

Frisch; Flachlagen und Mulden

Ajuga reptans-, Milium effusum-, Stachys sylvatica-, Juncus-, Lamium galeobdolon-, (Urtica dioica-, Impatiens noli-tangere-, Luzula luzuloides) - Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Mullmoder; Braunerde, selten Parabraunerde



Buchenwald auf saurem frischem grusigem Lehmboden (submontan); Buchen-Tannen-Wald auf saurem frischem grusigem Lehmboden (montan)

sgL+

blaßd'braun
d'rote Querstriche
d'grüne Querstrichelung

Frisch; Mulden und Flachlagen mit verzögertem Abfluss, besonders in Moorrändennähe

Deschampsia flexuosa-, Ajuga reptans-, Luzula luzuloides-, Milium effusum-, (Blechnum spicant-, Rubus) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Moder bis Rohhumus; Braunerde, örtlich starker podsolig



Buchenwald auf mäßig frischem grusigem Lehmboden (submontan); Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem grusigem Lehmboden (montan)

gL


blaßd'braun

Mäßig frisch; Flachlagen

Ajuga reptans-, Milium effusum-, Deschampsia flexuosa-, (Luzula luzuloides-, Urtica dioica-, Vaccinium) - Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Mullmoder; Braunerde, z.T. podsolig, und Parabraunerde



Buchen-Tannen-Wald auf saurem mäßig frischem grusigem Lehmboden

sgL

blaßd'braun
d'rote Querstrichelung

Mäßig frisch; Verebnungen und breite Rücken

Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, Rubus-, Blechnum spicant-, Milium effusum-, (Ajuga reptans-, Luzula luzuloides) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Moder bis Rohhumus; podsolige Braunerde

Öko-Serie der lehmigen Grusböden

(Mittel- bis tiefgründige, mindestens 40 cm tiefe steinarme, sandig-lehmig-grusige Böden aus +/- durchlässiger Verwitterungsdecke von Granit und Gneis; Korngröße wechselnd von grusigem Sand bis grusig-kleinsteinigem Schutt; Lehmgehalt gering, oft nach unten zunehmend)



Buchen-Tannen-Bergahorn-Wald auf frischem lehmigem Grusboden

IG+

Frisch; Flachlagen und Mulden

Ajuga reptans-, Milium effusum-, Lamium galeobdolon-, Luzula luzuloides-, (Blechnum spicant-, Rubus-, Vaccinium) - Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne, Waldmeister-Buchenwald mit Tanne, Waldmeister-Buchenwald mit Tanne - Frauenfarn

Mull bis Mullmoder; Braunerde, häufig stärker humos; im Unterboden teilweise pseudovergleyt



Buchen-Tannen-Wald auf saurem frischem lehmigem Grusboden

SIG+

Frisch; Flachlagen und Mulden mit verzögertem Abfluss

Ajuga reptans-, Vaccinium-, Blechnum spicant-, Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, (Rubus-, Aruncus dioicus-, Molinia) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Moder (Mullmoder) bis Rohhumus; podsolige Braunerde, örtlich pseudovergleyt



Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem lehmigem Grusboden


IG

Mäßig frisch; Flachlagen

Milium effusum-, Rubus-, Deschampsia flexuosa-, Vaccinium-, Urtica dioica-, (Luzula luzuloides-, Lamium galeobdolon) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mullmoder bis Mull; Braunerde



Buchen-Tannen-Wald auf saurem mäßig frischem lehmigem Grusboden


SIG

Mäßig frisch; Flachlagen und flache Oberhänge

Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, Rubus-, Milium effusum-, Luzula luzuloides-, Blechnum spicant-, Urtica dioica-, (Ajuga reptans) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Moder, örtlich bis Rohhumus; Braunerde und podsolige Braunerde



Buchen-Tannen-Wald auf stark saurem mäßig frischem lehmigem Grusboden


ssIG

Mäßig frisch; Flachlagen und breite Rücken

Vaccinium-, Blechnum spicant-, Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, Sphagnum angustifolium - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Rohhumus, örtlich rohhumusartiger Moder; podsolige Braunerde



Buchen-Tannen-Wald auf mäßig trockenem lehmigem Grusboden

IG-

Mäßig trocken; Flachlagen und breite, flache Rücken

Luzula luzuloides-, Deschampsia flexuosa-, (Milium effusum-, Vaccinium-, Ajuga reptans) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Moder, örtlich Hagerhumus; Braunerde, örtlich podsolig



Buchen-Tannen-Wald auf saurem mäßig trockenem lehmigem Grusboden

SIG-


h'grün
d'rote Querstriche
h'braune Querstrichelung

Mäßig trocken; Flachlagen, breite Rücken und Kuppen

Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, (Luzula luzuloides-, Milium effusum) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne


Moder, örtlich Rohhumus, meist Hagerhumus; podsolige Braunerde



Mäßig frischer Urgesteinsboden (historisch)

UB(his)

orange
h'grüne Senkrechtstriche




Mäßig trockene Urgesteinsböden (historisch)

UB-(his)

h'grün
d'rote Senkrechtstrichelung

Öko-Serie der lehmigen Steinschuttböden

(Flach- bis mittelgründige, nur 40 cm bohrbare, lehmig-grusige Böden aus Gneis- und Granitverwitterung mit hohem Steinschuttgehalt im Oberboden; dadurch teilweise eingeengter Wurzelraum)



Buchen-Tannen-Bergahorn-Wald auf frischem lehmigem Steinschuttboden

ISt+

h'grün
d'grüne Senkrechtstrichelung doppelt schwarz/

Frisch; Flachlagen und Mulden

Ajuga reptans-, Luzula luzuloides-, Milium effusum-, Deschampsia flexuosa-, (Impatiens noli-tangere-, Urtica dioica) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mull; humose Braunerde



Buchen-Tannen-Wald auf saurem frischem lehmigem Steinschuttboden

sISt+


h'grün
d'rote Senkrechtstrichelung doppelt schwarz/
d'grüne Senkrechtstrichelung doppelt schwarz/

Frisch; Flachlagen und Mulden

Ajuga reptans-, Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, (Impatiens noli-tangere-, Urtica dioica) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Moder; schwach podsolige humose Braunerde



Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem lehmigem Steinschuttboden

ISt


h'grün
schwarze Senkrechtstrichelung

Mäßig frisch; Flachlagen

Luzula luzuloides-, Deschampsia flexuosa-, Milium effusum-, Ajuga reptans-, (Impatiens noli-tangere-, Rubus) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Mullmoder, örtlich Moder; Braunerde, örtlich Ranker-Braunerde



Buchen-Tannen-Wald auf saurem mäßig frischem lehmigem Steinschuttboden

sISt


h'grün
d'rote Senkrechtstrichelung doppelt schwarz/

Mäßig frisch, örtlich mäßig trocken; Flachlagen und breite Rücken

Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, (Milium effusum-, Ajuga reptans-, Blechnum spicant) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Moder bis Mullmoder, örtlich Rohhumus; Braunerde bis podsolige Braunerde und Ranker-Braunerde

**Tannen-Buchen-Wald auf stark saurem mäßig frischem lehmigem Steinschuttboden****ssSt**


h'grün
schwarze Senkrechtstrichelung
d'rote Pluszeichen

Mäßig frisch und mäßig trocken; Flachlagen und breite Rücken

Vaccinium-, Blechnum spicant-, Deschampsia flexuosa-, (Sphagnum angustifolium-, Leucobryum glaucum) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Rohhumus, örtlich Moder; +/- podsolierte Braunerde und Ranker-Braunerde, örtlich Podsol


**Buchenwald auf mäßig trockenem lehmigem Steinschuttboden (submontan); Buchen-Tannen-Wald auf mäßig trockenem lehmigem Steinschuttboden (montan)****Ist-**

h'grün
h'braune Senkrechtstrichelung doppelt schwarz/

Mäßig trocken, örtlich trocken; Flachlagen und breite Rücken

Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, Vaccinium-, Milium effusum-, (Silene nutans) - Gruppe

Mullmoder bis Moder, örtlich Hagerhumus; Braunerde und Ranker-Braunerde, örtlich podsolig

**Buchen-Tannen-Wald auf saurem mäßig trockenem lehmigem Steinschuttboden****sISt-**

h'grün
d'rote Senkrechtstrichelung doppelt schwarz/
h'braune Senkrechtstrichelung doppelt schwarz/

Mäßig trocken und trocken; Rückenlagen


Deschampsia flexuosa-, Vaccinium-, Leucobryum glaucum-, (Milium effusum-, Luzula luzuloides) - Gruppe

Beerstrauch-Tannenwald, Beerstrauch-Tannenwald, Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne, Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Moder. örtlich Rohhumus: +/- podsolierte Braunerde und Ranker-Braunerde

Öko-Serie der Rötellehme

(Mittel- bis tiefgründige, meist karminrote, schluffig-feinsandige bis schluffig-tonige Lehme, teils glimmerreich mit Tonsteinbröckchen aus Verwitterung des Oberen Rotliegenden)

**Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem Rötellehm****RL**

h'grün
d'braune Punkte

Grundfrisch und mäßig frisch; Flachlagen und breite Rücken


Ajuga reptans-, Luzula luzuloides-, Milium effusum-, Deschampsia flexuosa-, (Juncus-, Lamium galeobdolon-, Vaccinium-, Molinia) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Mullmoder; Braunerde

Öko-Serie der mehr oder weniger vernässenden Kristallinböden

(Lehmig-grusige Verwitterungsdecken (des Kristallins) mit ± undurchlässig igem, meist tonigem Untergrund und wechselnden Staunässeanzeichen; im Grenzbereich zum Buntsandstein mit Quellhorizont)

**Tannen-Fichten-Buchen-Wald auf wechselfeuchtem Kristallinboden****wfKB**


h'grün
schwarze Wellenlinien

Wechselfeucht, örtlich vernässend; Verebnungen und Muldenlagen

Deschampsia flexuosa-, Juncus-, Impatiens noli-tangere-, Blechnum spicant-, (Molinia-, Vaccinium) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne, Hainsimsen-Fichten-Tannenwald

Moder, örtlich Mullmoder; Pseudogley, z. T. auch Braunerde-Pseudogley

**Tannen-Fichten-Buchen-Wald auf grundfeuchtem Kristallinboden****gfKb**

h'grün
d'grüne Wellenlinien

Grundfrisch und grundfeucht; Flachlagen und Mulden


Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, Impatiens noli-tangere-, Deschampsia flexuosa-, (Juncus-, Vaccinium-, Blechnum spicant-, Lamium galeobdolon) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne, Hainsimsen-Fichten-Tannenwald

Moder bis Mullmoder; Pseudogley-Braunerde bis Braunerde-Pseudogley

Öko-Serie der Sande

(Mittel- bis tiefgründiger, örtlich auch flachgründiger, z.T. steiniger, meist mittel- bis feinkörniger, durchlässiger Sand bis schwach lehmiger Sand aus Verwitterung des Oberen Buntsandsteins)



Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem Sand

S


h'grün
schwarze Sandpunkte

Mäßig frisch; Flachlagen

Deschampsia flexuosa-, *Rubus-*, *Milium effusum-*, *Vaccinium-*, *Ajuga reptans-*,
(*Impatiens noli-tangere-*, *Luzula luzuloides-*, *Molinia*) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mullmoder bis Moder; podsolige Braunerde bis Podsol-Braunerde



Buchen-Tannen-Wald auf stark saurem mäßig frischem Sand

sS


h'grün
d'rote Senkrechtstrichelung
schwarze Sandpunkte

Mäßig frisch; Flachlagen und breite flache Rücken

Vaccinium-, *Blechnum spicant-*, *Deschampsia flexuosa-*, *Sphagnum angustifolium-*, *Luzula luzuloides-*, (*Rubus-*, *Leucobryum glaucum*) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Rohhumus bis Moder; podsolige Braunerde bis Braunerde-Podsol



Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenem Sand (submontan); Buchen-Tannen-Wald auf mäßig trockenem Sand (montan)

S-

orange
schwarze Sandpunkte

Mäßig trocken und trocken; Flachlagen und Rücken

Vaccinium-, *Deschampsia flexuosa-*, *Luzula luzuloides-*, (*Milium effusum-*, *Leucobryum glaucum*) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Moder bis Rohhumus; podsolige Braunerde bis Braunerde-Podsol



Blockreicher Sand (submontan); Buchen-Tannen-Wald auf blockreichem Sand (montan)

bIS

h'grün
schwarze Dreiecke leer
schwarze Sandpunkte

Mäßig trocken; Flachlagen


Vaccinium-, *Deschampsia flexuosa-*, *Luzula luzuloides-*, (*Milium effusum-*, *Leucobryum glaucum*) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Rohhumus bis Moder; podsolige Braunerde

Öko-Serie der lehmigen Sande

(Mittel- bis tiefgründiger lehmiger Sand bis sandiger Lehm, örtlich +/- steinig und flachgründig, aus Verwitterung und Fließerden des Oberen Buntsandsteins; teilweise im tieferen Unterboden sandig-lehmig-tonig, meist im Grenzbereich zum Kristallin)



Buchen-Tannen-Wald auf frischem lehmigem Sand

IS+

orange
d'grüne Senkrechtstriche

Frisch, örtlich bis grundfrisch; Mulden

Ajuga reptans-, *Milium effusum-*, *Stachys sylvatica-*, *Impatiens noli-tangere-*,
(*Juncus-*, *Deschampsia flexuosa-*, *Luzula luzuloides*) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Mullmoder; Braunerde



Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem lehmigem Sand

IS







orange

Mäßig frisch bis grundfrisch; Flachlagen, örtlich auch breite Rücken

Rubus-, *Milium effusum-*, *Deschampsia flexuosa-*, *Vaccinium-*, (*Urtica dioica-*, *Ajuga reptans-*, *Luzula luzuloides*) - Gruppe


Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mullmoder bis Moder, örtlich Mull; +/- podsolige Braunerde

	Buchen-Tannen-Wald auf stark saurem mäßig frischem lehmigem Sand
sIS	<p>Mäßig frisch; Flachlagen</p> <p>Vaccinium-, Blechnum spicant-, Deschampsia flexuosa-, Sphagnum angustifolium-, (Luzula luzuloides-, Rubus-, Milium effusum) - Gruppe</p> <p>Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne</p> <p>Moder bis Rohhumus, nach Kalkung bis Mullmoder; podsolige bis podsolierte Braunerde</p>
	Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenem lehmigem Sand (submontan); Buchen-Tannen-Wald auf mäßig trockenem lehmigem Sand (montan)
IS-	<p>Mäßig trocken und wechseltrocken; Flachlagen und Rücken</p> <p>Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, Molinia-, (Leucobryum glaucum-, Luzula luzuloides) - Gruppe</p> <p>Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne</p> <p>Moder bis Rohhumus; podsolige bis podsolierte Braunerde</p>
	Buchen-Tannen-Wald auf basenreichem mäßig frischem sandigem Lehm
basal	<p>Mäßig frisch; Flachlagen</p> <p>Milium effusum-, Rubus-, Urtica dioica-, Ajuga reptans-, Lamium galeobdolon - Gruppe</p> <p>Waldmeister-Buchenwald mit Tanne</p> <p>Mull bis Mullmoder; Braunerde</p>
	Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem sandigem Lehm
saL	<p>Mäßig frisch; Flachlagen</p> <p>Milium effusum-, Rubus-, Vaccinium-, Luzula luzuloides-, Deschampsia flexuosa-, (Urtica dioica-, Ajuga reptans-, Lamium galeobdolon) - Gruppe</p> <p>Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne</p> <p>Mullmoder bis Mull; Braunerde</p>
	Buchen-Tannen-Wald auf stark saurem mäßig frischem sandigem Lehm
ssal	<p>Mäßig frisch, örtlich grundfrisch; Flachlagen</p> <p>Vaccinium-, Blechnum spicant-, Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, Molinia-, (Sphagnum angustifolium) - Gruppe</p> <p>Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne</p> <p>Moder bis Rohhumus; podsolige Braunerde bis Braunerde</p>
	Buchen-Tannen-Wald auf tongründigem sandigem Lehm
tgsaL	<p>Mäßig frisch; Flachlagen</p> <p>Milium effusum-, Deschampsia flexuosa-, Ajuga reptans-, Vaccinium-, Luzula luzuloides-, Molinia-, (Urtica dioica-, Rubus) - Gruppe</p> <p>Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne</p> <p>Mullmoder bis Moder; Braunerde, teils podsolig</p>
	Buchen-Tannen-Wald auf stark saurem tongründigem sandigem Lehm
stgsaL	<p>Mäßig frisch; Flachlagen</p> <p>Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, Leucobryum glaucum-, Luzula luzuloides-, (Molinia-, Blechnum spicant-, Rubus-, Sphagnum angustifolium) - Gruppe</p> <p>Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne</p> <p>Moder bis Rohhumus; podsolige Braunerde, im Unterboden schwach pseudovergleyt, zum Teil zweischichtig</p>

Öko-Serie der vernässenden lehmigen Sande

(Tief- bis mittelgründige, ± marmorierte sandige Lehme bis lehmige Sande aus Buntsandsteinverwitterung im Grenzbereich zum Kristallin; stauender, toniger, dichtgelagerter Unterboden)




Tannen-Buchen-Wald auf wechselfeuchtem lehmigem Sand (submontan); Tannen-Buchen-Fichten-Wald auf wechselfeuchtem lehmigem Sand (montan)

wfS Wechselfeucht; Mulden

orange
schwarze Wellenlinien

Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, Blechnum spicant-, Molinia-, (Milium effusum-, Sphagnum angustifolium) - Gruppe
Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne, Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne, Beerstrauch-Tannenwald
Moder bis Rohhumus; Pseudogley (bis Stagnogley)



Tannen-Buchen-Fichten-Wald auf vernässendem lehmigem Sand (submontan); Tannen-Fichten-Wald auf vernässendem lehmigem Sand (montan)


vnIS Vernässend; abzugsträge Verebnungen

orange
schwarze Wellenlinien doppelt

Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, Molinia-, Blechnum spicant-, Sphagnum angustifolium-, (Rubus-, Luzula luzuloides-, Milium effusum) - Gruppe
Beerstrauch-Tannenwald, Beerstrauch-Tannenwald, Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne
Moder bis feuchter Rohhumus; Pseudogley bis Stagnogley

Öko-Serie der vernässenden Lehme

(Meist tiefgründige (mindestens 50 cm) +/- stark staunässegezeichnete, teils grusige Lehme des Kristallins, teils Mischlehme des Buntsandsteins, örtlich Schlufflehme, über +/- undurchlässigem Untergrund)



Tannen-Buchen-Wald auf wechselfeuchtem Lehm

wfL


Schwach wechselfeucht und wechselfeucht, örtlich grundfeucht (bis nass); Flach- und Muldenlagen

h'braun
schwarze Wellenlinien

Ajuga reptans-, Rubus-, Juncus-, Milium effusum-, (Impatiens noli-tangere-, Stachys sylvatica-, Urtica dioica) - Gruppe
Waldmeister-Buchenwald mit Tanne - Frauenfarn, Waldmeister-Buchenwald mit Tanne
Mull bis Moder (selten Rohhumus); Braunerde-Pseudogley bis Pseudogley

Gruppe der Missem

(Etwa 15 bis 30 cm, z.T. torfartige Humusauflage über stark staunässegeprägten, meist tiefgründigen (physiologisch bis flachgründigen), im Unterboden tonigen und +/- stark dichtgelagerten, schwer durchlässigen, sandigen Lehmen bis lehmigen Sanden auf Buntsandstein, seltener grusige Lehme auf Kristallin; örtlich Anmoor- bis Torf-Auflage)



Tannen-Fichten-Wald auf wasserzügiger Missem

wzM

Grundfeucht und quellig (örtlich nass); flache Senken und Mulden

blaßviolett
d'grüne Senkrechtstriche doppelt einfarbig

Vaccinium-, Sphagnum angustifolium-, Blechnum spicant-, (Luzula luzuloides-, Molinia-, Ajuga reptans-, Urtica dioica-, Stachys sylvatica) - Gruppe
Beerstrauch-Tannenwald
Rohhumus; Pseudogley (Stagnogley)



Tannen-Fichten-Wald auf schwach wasserzügigen Missem

Mi

Vernässend; Flachlagen und Mulden, teils mit künstlichen Gräben

blaßviolett
d'grüne Senkrechtstriche

Vaccinium-, Sphagnum angustifolium-, Molinia-, Blechnum spicant-, (Deschampsia flexuosa) - Gruppe
Beerstrauch-Tannenwald
Rohhumus bis Feuchtorrhhumus; örtlich Anmoor bis Torf; Pseudogley (bis Moorgley)

Öko-Serie der Feinlehmae

(Tiefgründiger (mind. 60 cm), gelbbrauner, im Oberboden teils fahlbrauner, schluffig-feinsandiger Lehm, meist lösslehmvermengte Fließerde, überwiegend über durchlässigem Oberem Buntsandstein, selten Kristallin)



h'braun

Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem Feinlehm

FL

Mäßig frisch, örtlich grundfrisch; Flachlagen

Milium effusum-, *Luzula luzuloides-*, *Ajuga reptans-*, *Juncus-*, *Deschampsia flexuosa-*, (*Vaccinium-*, *Molinia*) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mullmoder bis Moder; Braunerde bis Parabraunerde, teils podsolig und im Unterboden schwach pseudovergleyt

h'braun
d'rote Senkrechtstrichelung

Buchen-Tannen-Wald auf saurem mäßig frischem Feinlehm

sFL

Mäßig frisch bis grundfrisch; Flachlagen

Deschampsia flexuosa-, *Vaccinium-*, *Luzula luzuloides-*, *Milium effusum* - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Moder bis Rohhumus; podsolige Braunerde bis podsolige Parabraunerde, örtlich im Unterboden schwach pseudovergleyt

Öko-Serie der Mergelböden und Mergeltone

(Lehmig-tonige Mergelverwitterung über mehr oder weniger durchlässigen, teils steinigen, teils bröseligen, wenig bis mäßig plastizierten Kalk- und Dolomitmergeln des Unteren und Mittleren Muschelkalks; bei den Mergeltönen plastizierter, schluffiger (auch lehmiger) Ton 15 bis 40 cm mächtig; freies Karbonat zwischen 0 und 40 cm Tiefe; stellenweise Schlufflehmauflage bis etwa 25 cm)

oliv
h'grüne Senkrechtstrichelung

Buchenwald auf mäßig frischem Mergelton (submontan); Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem Mergelton (montan)

MeT

Mäßig frisch; Flachlagen

Milium effusum-, *Mercurialis perennis-*, *Urtica dioica-*, *Lamium galeobdolon-*, *Rubus-*, (*Vaccinium-*, *Carex flacca*) - Gruppe

Waldgersten-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Mullmoder; Pelosol-Braunerde, Pelosol, Kalkpelosol

oliv
d'gelbe Senkrechtstrichelung

Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenem Mergelton

MeT-

Mäßig trocken; Verebnungen und breite Rücken

Milium effusum-, *Mercurialis perennis-*, *Lamium galeobdolon-*, *Vaccinium-*, *Carex flacca-*, *Silene nutans* - Gruppe

Waldgersten-Buchenwald mit Tanne

Öko-Serie der Tonböden

(Mindestens 40 cm entkarbonatisierter, zähplastischer Ton oder schluffiger Ton über verwitterten, wenig plastizierten (kalkreichen) Tonmergeln des Unterer Muschelkalks: meist nur geringe oder keine schluffig-lehmige Auflage oder tonig-lehmiger Oberboden)



Buchen-Hainbuchen-Wald auf mäßig frischem Ton (submontan); Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem Ton (montan)

T

Mäßig frisch, örtlich schwach wechselfeucht; meist schattseitig geneigte Flachlagen

oliv

Milium effusum-, Rubus-, Ajuga reptans-, Mercurialis perennis-, Carex flacca-, Lamium galeobdolon-, (Luzula luzuloides-, Urtica dioica) - Gruppe

Waldgersten-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Mullmoder; mittel- bis tiefgründiger Pelosol bis Pseudogley-Pelosol



Tannenwald auf wechselfeuchtem Ton

wfT

Wechselfeucht; ebene Lagen und Mulden

oliv
schwarze Wellenlinien

Milium effusum-, Ajuga reptans-, Lamium galeobdolon-, Rubus-, Impatiens noli-tangere-, Mercurialis perennis - Gruppe

Labkraut-Tannenwald



Buchen-Tannen-Hainbuchen-Wald auf weidegestörtem mäßig frischem Ton (submontan); Buchen-Tannen-Wald auf weidegestörtem mäßig frischem Ton (montan)

wgT


Mäßig frisch; Flachlagen

oliv
d'rote liegende Achten

Vaccinium-, Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Carex flacca-, Rubus-, Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, (Lamium galeobdolon-, Ajuga reptans) - Gruppe

Waldgersten-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Moder; Pelosol



Mäßig trockener Ton (submontan); Buchen-Tannen-Wald auf mäßig trockenem Ton (montan)

T-

Mäßig trocken; sonnseitig geneigte Flachlagen

oliv
d'gelbe Querstriche

Milium effusum-, Lamium galeobdolon-, Luzula luzuloides-, Deschampsia flexuosa-, Vaccinium-, Mercurialis perennis - Gruppe

Waldgersten-Buchenwald mit Tanne

Mullmoder bis Moder; Rendzina-Pelosol

B. Standorte der steileren Hänge

Öko-Serie der grusigen Lehmhänge

(Mittel- bis tiefgründige, meist steinarme, lehmige Böden der Kristallinverwitterung mit meist geringem, wechselndem Sand- und Grusanteil; örtlich Schlufflehmvergütung in der submontanen Höhenstufe)



Buchen-Tannen-Bergahorn-Wald auf frischem lehmigem Winterhang

IWH+

Frisch; Unterhänge und Hangmulden

blaßd'braun
d'grüne Schräggitter
d'grüne Querstrichelung

Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, Milium effusum-, Luzula luzuloides-, (Impatiens noli-tangere-, Juncus-, Rubus-, Lamium galeobdolon) - Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Mullmoder; Braunerde



Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem lehmigem Winterhang

IWH


blaßd'braun
d'braune Schräggitter

Mäßig frisch, selten mäßig trocken; Hanglagen

Ajuga reptans-, *Milium effusum-*, *Luzula luzuloides-*, (*Lamium galeobdolon-*,
Juncus-, *Deschampsia flexuosa*) - Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne, Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Moder; Braunerde



Buchen-Tannen-Wald auf saurem mäßig frischem lehmigem Winterhang

sIWH

blaßd'braun
d'braune Schräggitter
d'rote Querstrichelung

Mäßig frisch; Hanglagen

Deschampsia flexuosa-, *Luzula luzuloides-*, *Milium effusum-*, (*Vaccinium*) -
Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Moder, örtlich Rohhumus; Braunerde bis Podsol-Braunerde



Buchen-Tannen-Bergahorn-Wald auf frischem lehmigem Sommerhang

ISH+

blaßd'braun
h'grüne Schräggitter

Frisch; Unterhänge und Hangmulden

Ajuga reptans-, *Milium effusum-*, *Luzula luzuloides-*, (*Stachys sylvatica*) -
Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Mull, selten Mullmoder; Braunerde



Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem lehmigem Sommerhang

ISH


blaßd'braun
h'braune Schräggitter

Mäßig frisch (örtlich bis mäßig trocken); Hanglagen

Milium effusum-, *Ajuga reptans-*, *Luzula luzuloides-*, (*Rubus-*, *Deschampsia flexuosa-*, *Vaccinium*) - Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne, Waldmeister-Buchenwald mit Tanne,
Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Mullmoder; Braunerde



Buchen-Tannen-Wald auf saurem mäßig frischem lehmigem Sommerhang

sISH

blaßd'braun
h'braune Schräggitter
d'rote Querstrichelung

Mäßig frisch; Hanglagen

Vaccinium-, *Deschampsia flexuosa-*, (*Blechnum spicant-*, *Milium effusum*) -
Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Moder bis Rohhumus; Braunerde bis podsolige Braunerde

Öko-Serie der lehmigen Grushänge

(Mittel- bis tiefgründiger, mindestens 40 cm tiefer, örtlich steiniger, sandig-lehmig-grusiger Hangschutt aus Verwitterung von Granit und Gneis; Korngröße wechselnd von grusigem Sand bis grusig-kleinsteiniigem Schutt; Lehmgehalt gering, oft nach unten zunehmend)



Buchen-Tannen-Bergahorn-Wald auf frischem lehmig-grusigem Winterhang

IgWH+

satth'grün
d'grüne Schräggitter
d'grüne Senkrechtstrichelung

Frisch; Hangmulden und Unterhänge

Ajuga reptans-, *Milium effusum-*, *Urtica dioica-*, *Lamium galeobdolon-*, *Rubus-*,
(*Mercurialis perennis-*, *Luzula luzuloides-*, *Stachys sylvatica*) - Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Mullmoder; Braunerde

	Buchen-Tannen-Wald auf saurem frischem lehmig-grusigem Winterhang sIgWH+	Frisch; Hangmulden und Unterhänge mit verzögertem Abfluss, meist in Moornähe Ajuga reptans-, Blechnum spicant-, Lamium galeobdolon-, Vaccinium-, (Milium effusum-, Luzula luzuloides-, Stachys sylvatica) - Gruppe Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne Moder bis Rohhumus; podsolige Braunerde
	Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem lehmig-grusigem Winterhang IgWH	Mäßig frisch; Hanglagen Milium effusum-, Urtica dioica-, Rubus-, Luzula luzuloides-, Ajuga reptans-, Lamium galeobdolon-, Deschampsia flexuosa-, Vaccinium - Gruppe Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne Mull bis Mullmoder, örtlich Moder; Braunerde
	Buchen-Tannen-Wald auf saurem mäßig frischem lehmig-grusigem Winterhang sIgWH	Mäßig frisch; Hanglagen Vaccinium-, Luzula luzuloides-, Deschampsia flexuosa-, (Milium effusum-, Rubus-, Ajuga reptans-, Blechnum spicant) - Gruppe Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne Moder, örtlich Rohhumus; Braunerde bis podsolige Braunerde
	Tannen-Buchen-Wald auf stark saurem mäßig frischem lehmig-grusigem Winterhang ssIgWH	Mäßig frisch; Hanglagen Vaccinium-, Blechnum spicant-, Deschampsia flexuosa-, (Sphagnum angustifolium) - Gruppe Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne Rohhumus; podsolige Braunerde bis Podsol-Braunerde
	Buchenwald auf mäßig trockenem lehmig-grusigem Winterhang (submontan); Buchen-Tannen-Wald auf mäßig trockenem lehmig-grusigem Winterhang (montan) IgWH-	Mäßig trocken; Oberhänge und Hangrücken Deschampsia flexuosa-, Vaccinium-, Luzula luzuloides-, (Milium effusum) - Gruppe Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne Mullmoder bis Moder, örtlich Hagerhumus; +/- podsolige Braunerde
	Buchen-Tannen-Bergahorn-Wald auf frischem lehmig-grusigem Sommerhang IgSH+	Frisch; Unterhänge und Hangmulden Ajuga reptans-, Milium effusum-, Urtica dioica-, Rubus-, Lamium galeobdolon-, (Impatiens noli-tangere-, Luzula luzuloides) - Gruppe Waldmeister-Buchenwald mit Tanne Mull bis Mullmoder; Braunerde



Buchen-Tannen-Traubeneichen-Wald auf mäßig frischem lehmig-grusigem Sommerhang (submontan); Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem lehmig-grusigem Sommerhang (montan)

IgSH


blaßh'grün
h'braune Schräggitter

Mäßig frisch; Hanglagen

Milium effusum-, Rubus-, Urtica dioica-, Luzula luzuloides-, Ajuga reptans-, (Lamium galeobdolon-, Mercurialis perennis-, Deschampsia flexuosa-, Vaccinium) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Mullmoder; Braunerde



Buchen-Traubeneichen-Wald auf saurem mäßig frischem lehmig-grusigem Sommerhang (submontan); Buchen-Tannen-Wald auf saurem mäßig frischem lehmig-grusigem Sommerhang (montan)

slgSH


blaßh'grün
h'braune Schräggitter
d'rote Querstrichelung

Mäßig frisch, selten mäßig trocken; Hanglagen

Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, (Milium effusum-, Rubus-, Ajuga reptans) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Moder bis Rohhumus; podsolige bis podsolierte Braunerde



Tannen-Buchen-Fichten-Wald auf stark saurem mäßig frischem lehmig-grusigem Sommerhang (nicht typisch)

sslgSH


blaßh'grün
h'braune Schräggitter
d'rote Pluszeichen

Mäßig frisch; Hanglagen

Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, Blechnum spicant-, Sphagnum angustifolium-, (Ajuga reptans) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Rohhumus; podsolige Braunerde, örtlich bis Braunerde-Podsol



Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenem lehmig-grusigem Sommerhang (submontan); Buchenwald auf mäßig trockenem lehmig-grusigem Sommerhang (montan)

IgSH-


blaßh'grün
orange Schräggitter

Mäßig trocken; Hanglagen, Oberhänge und Hangrücken

Luzula luzuloides-, Deschampsia flexuosa-, (Vaccinium-, Milium effusum) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Moder, örtlich Hagerhumus; Braunerde, z. T. podsolig



Buchen-Traubeneichen-Wald auf saurem mäßig trockenem lehmig-grusigem Sommerhang (submontan); Buchenwald auf saurem mäßig trockenem lehmig-grusigem Sommerhang (montan)

slgSH-


blaßh'grün
orange Schräggitter
d'rote Querstrichelung

Mäßig trocken; Hanglagen und Hangrücken

Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, (Luzula luzuloides-, Leucobryum glaucum) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Moder bis Rohhumus, örtlich Hagerhumus; podsolige Braunerde



Buchen-Traubeneichen-Wald auf stark saurem mäßig trockenem lehmig-grusigem Sommerhang

sslgSH-


blaßh'grün
orange Schräggitter
d'rote Pluszeichen

Mäßig trocken; Ober- und Mittelhanglagen

Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, (Leucobryum glaucum-, Blechnum spicant-, Luzula luzuloides) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Rohhumus; podsolige Braunerde



blaßh'grün
orange Schräggitter

Mäßig frischer Urgesteins-Winterhang (historisch)

UWH(his)

Öko-Serie der lehmigen Steinschutthänge

(Flach- bis mittelgründiger, selten tiefgründiger, stark steiniger, lehmig-sandig-grusiger Hangschutt der Kristallinverwitterung, meist Gneise und Ganggesteine, örtlich auch lehmarm und Steinschutt oft schon im Oberboden; z.T. eingeengter Wurzelraum; Bohrtiefe meist weniger als 40 cm)



satth'grün
d'grüne Schräggitter
schwarze Senkrechtstrichelung

Buchen-Tannen-Bergahorn-Wald auf frischem lehmigem Steinschutt-Winterhang

IStWH+

Frisch; Hangmulden und Unterhänge

Ajuga reptans-, Rubus-, Milium effusum-, Urtica dioica-, Lamium galeobdolon-, (Mercurialis perennis-, Luzula luzuloides) - Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Mullmoder; Braunerde, örtlich Ranker-Braunerde



satth'grün
d'braune Schräggitter
schwarze Senkrechtstrichelung

Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem lehmigem Steinschutt-Winterhang

IStWH

Mäßig frisch; Hanglagen

Milium effusum-, Rubus-, Lamium galeobdolon-, Urtica dioica-, (Luzula luzuloides-, Vaccinium-, Mercurialis perennis-, Deschampsia flexuosa-, Ajuga reptans) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne, Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Mullmoder; Braunerde, örtlich Ranker-Braunerde



satth'grün
d'braune Schräggitter
d'rote Senkrechtstrichelung doppelt
schwarz/

Buchen-Tannen-Wald auf saurem mäßig frischem lehmigem Steinschutt-Winterhang

sIStWH

Mäßig frisch; Hanglagen

Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, Vaccinium-, Ajuga reptans-, Rubus - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Moder (bis Rohhumus); podsolige Braunerde bis Ranker-Braunerde



satth'grün
d'braune Schräggitter
schwarze Senkrechtstrichelung
d'rote Pluszeichen

Stark saurer mäßig frischer lehmiger Steinschutt-Winterhang (nicht typisch)

ssIStWH

Mäßig frisch (bis frisch); Hanglagen

Vaccinium-, Blechnum spicant-, Deschampsia flexuosa-, Sphagnum angustifolium - Gruppe

Rohhumus; podsolige Braunerde bis podsolisierte Ranker-Braunerde



satth'grün
orange Schräggitter
schwarze Senkrechtstrichelung

Buchen-Tannen-Wald auf mäßig trockenem lehmigem Steinschutt-Winterhang

IStWH-

Mäßig trocken; Oberhänge und Hangrücken

Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, Milium effusum-, Vaccinium - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mullmoder bis Moder, selten Mull; Braunerde, auch Ranker-Braunerde

	Buchen-Tannen-Wald auf saurem mäßig trockenem lehmigem Steinschutt-Winterhang
sIStWH- satth'grün orange Schräggitter d'rote Senkrechtstrichelung doppelt schwarz/	Mäßig trocken; Oberhänge und breitere Hangrückenlagen Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, (Silene nutans-, Milium effusum-, Leucobryum glaucum) - Gruppe Moder, örtlich Rohhumus; Braunerde bis Ranker-Braunerde, örtlich podsolig
	Buchen-Tannen-Bergahorn-Wald auf frischem lehmigem Steinschutt-Sommerhang
IStSH+ blaßh'grün h'grüne Schräggitter schwarze Senkrechtstrichelung	Frisch; Hangmulden und Unterhänge Ajuga reptans-, Lamium galeobdolon-, Stachys sylvatica-, Impatiens noli-tangere-, Milium effusum-, (Luzula luzuloides-, Rubus) - Gruppe Waldmeister-Buchenwald mit Tanne Mull bis Mullmoder; Braunerde
	Buchen-Tannen-Traubeneichen-Wald auf mäßig frischem lehmigem Steinschutt-Sommerhang (submontan); Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem lehmigem Steinschutt-Sommerhang (montan)
IStSH blaßh'grün h'braune Schräggitter schwarze Senkrechtstrichelung	Mäßig frisch (örtlich mäßig trocken); Hanglagen Luzula luzuloides-, Deschampsia flexuosa-, Lamium galeobdolon-, (Milium effusum-, Ajuga reptans-, Vaccinium) - Gruppe Waldmeister-Buchenwald mit Tanne, Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne, Waldmeister-Buchenwald mit Tanne, Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne Mull bis Mullmoder, örtlich Moder; Braunerde, örtlich Ranker-Braunerde
	Buchen-Tannen-Wald auf saurem mäßig frischem lehmigem Steinschutt-Sommerhang
sIStSH blaßh'grün h'braune Schräggitter d'rote Senkrechtstrichelung doppelt schwarz/	Mäßig frisch (örtlich mäßig trocken); Hanglagen Deschampsia flexuosa-, Vaccinium-, (Ajuga reptans-, Milium effusum) - Gruppe Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne Moder, örtlich Rohhumus; podsolige Braunerde bis Ranker-Braunerde
	Stark saurer mäßig frischer lehmiger Steinschutt-Sommerhang (nicht typisch)
ssiStSH blaßh'grün h'braune Schräggitter schwarze Senkrechtstrichelung d'rote Pluszeichen	Mäßig hangfrisch bis mäßig trocken; Hanglagen, meist steilere, sonnseitige Ober- und Mittelhänge Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides - Gruppe Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne Rohhumus, örtlich Moder; podsolierte Braunerde und Ranker-Braunerde, örtlich Podsol
	Buchen-Tannen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenem lehmigem Steinschutt-Sommerhang (submontan); Buchen-Tannen-Wald auf mäßig trockenem lehmigem Steinschutt-Sommerhang (montan)
IStSH- blaßh'grün orange Schräggitter schwarze Senkrechtstrichelung	Mäßig trocken, örtlich trocken; Hanglagen und Hangrücken Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, Vaccinium-, (Leucobryum glaucum) - Gruppe Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne Moder bis Mullmoder, örtlich Hagerhumus; Braunerde bis Ranker-Braunerde, örtlich podsolig



Buchen-Tannen-Traubeneichen-Wald auf saurem mäßig trockenem lehmigem Steinschutt-Sommerhang (submontan); Buchen-Tannen-Wald auf saurem mäßig trockenem lehmigem Steinschutt-Sommerhang (montan)

sIStSH-

blaßh'grün
orange Schräggitter
d'rote Senkrechtstrichelung doppelt
schwarz/

Mäßig trocken, örtlich trocken; Hanglagen, Oberhänge und Hangrücken

Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, Leucobryum glaucum-, Luzula luzuloides - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mullmoder bis Rohhumus; Braunerde und Ranker-Braunerde, meist podsolig




Mäßig trockener Urgesteins-Sommerhang (historisch)

USH-(his)

h'grün
d'gelbe Schräggitter

Öko-Serie der Steinschutthänge

(Mächtigere, lehmarme, steinige Hangschuttanreicherungen (Steindurchmesser i.a. unter 20 cm) aus Kristallinverwitterung; der z.T. im tieferen Unterboden vorhandene Lehmanteil meist nicht nachweisbar, da nur flache bis mittlere Bohrgründigkeit (weniger als 40 cm); Wurzelraum z.T. stark eingeengt; fließende Übergänge zu den meist oberhalb angrenzenden Block- und Felshängen)



Buchen-Tannen-Bergahorn-Wald auf frischem Steinschutt-Winterhang

StWH+


satth'grün
d'grüne Schräggitter
schwarze Senkrechtstrichelung doppelt
einfarbig

Frisch; Hangmulden und Unterhänge

Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, Lamium galeobdolon-, Impatiens noli-tangere-, (Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Urtica dioica) - Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Mullmoder; Ranker-Braunerde und Braunerde



Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem Steinschutt-Winterhang


StWH

satth'grün
d'braune Schräggitter
schwarze Senkrechtstrichelung doppelt
einfarbig

Mäßig frisch (selten mäßig trocken); Hanglagen

Milium effusum-, Ajuga reptans-, Deschampsia flexuosa-, (Lamium galeobdolon-, Mercurialis perennis-, Vaccinium) - Gruppe

Mullmoder bis Mull, selten Moder; Ranker-Braunerde bis Braunerde, örtlich +/- podsolig



Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem Steinschutt-Sommerhang

StSH


blaßh'grün
h'braune Schräggitter
schwarze Senkrechtstrichelung doppelt
einfarbig

Mäßig frisch (selten bis frisch); Hanglagen und Hangmulden

Luzula luzuloides-, Deschampsia flexuosa-, Milium effusum-, (Ajuga reptans-, Vaccinium-, Lamium galeobdolon-, Silene nutans) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Moder; Ranker-Braunerde bis Braunerde



Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenem Steinschutt-Sommerhang

StSH-

blaßh'grün
orange Schräggitter
schwarze Senkrechtstrichelung doppelt
einfarbig

Mäßig trocken, örtlich trocken; Hanglagen und Hangrücken


Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, Vaccinium-, Milium effusum-, Silene nutans - Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Mullmoder bis Moder, örtlich Hagerhumus; Ranker-Braunerde bis Braunerde

Öko-Serie der Rötellehmhänge

(Mittel- bis tiefgründiger, sandig-schluffig-toniger Lehm, örtlich bis lehmiger Ton, aus Hangschutt des Oberrotliegenden; rotstichig bis karminrot; örtlich "Mischlehm" durch Buntsandsteinbeimengung)



Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem Rötellehmhang

RLH

Mäßig frisch (örtlich bis frisch oder mäßig trocken); meist sonnseitige Hanglagen

h'grün
h'grüne Schräggitter
d'braune Punkte

Milium effusum-, Luzula luzuloides-, Deschampsia flexuosa-, Ajuga reptans-, (Juncus-, Vaccinium-, Lamium galeobdolon) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Mullmoder, örtlich Moder; Braunerde, örtlich +/-podsolig

Öko-Serie der Buntsandsteinhänge

(Mittel- bis tiefgründiger lehmiger Sand bis sandiger Lehm, örtlich auch Sand bis steiniger Sand aus Hangschutt des Oberen Buntsandsteins)



Basenreicher mäßig frischer Buntsandstein-Winterhang

baBWH

Mäßig frisch; schattseitige Hänge

orange
d'grüne Schräggitter
bläulich graugrüne Punkte

Urtica dioica-, Ajuga reptans-, Milium effusum-, Rubus-, Lamium galeobdolon - Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne



Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem Buntsandstein-Winterhang


BWH

Mäßig frisch und hangfrisch; schattseitige Hänge und Hangmulden

Deschampsia flexuosa-, Vaccinium-, Luzula luzuloides-, Milium effusum-, Ajuga reptans - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Mullmoder; Braunerde



Buchen-Tannen-Bergahorn-Wald auf frischem Buntsandstein-Sommerhang

BSH+

Frisch; sonnseitige Unterhänge

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

blaßorange
h'grüne Schräggitter
h'grüne Senkrechtrichtelung



Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem Buntsandstein-Sommerhang


BSH

Mäßig frisch, örtlich mäßig trocken; Hanglagen

Vaccinium-, Luzula luzuloides-, Milium effusum-, Rubus-, Deschampsia flexuosa-, (Ajuga reptans-, Urtica dioica) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mullmoder bis Moder; podsolige bis podsolierte Braunerde




Mäßig frischer Buntsandsteinhang (historisch)

BH(his)

orange
h'grüne Schräggitter

Öko-Serie der Mergelhänge und Mergeltonhänge

(Mehr oder weniger entwickelte, an oder bis nahe der Oberfläche karbonatreiche, kleinsteinig-mergelig-schluffige bis im Ansatz plastizierte, lehmig-tonige Böden aus Verwitterung von Schichten des Unteren Muschelkalks)




Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig frischem Mergeltonhang (submontan);
Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem Mergeltonhang (montan)

MeTH

Mäßig frisch; Hänge

oliv
h'grüne Schräggitter
h'grüne Senkrechtstrichelung

Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Lamium galeobdolon-, (Luzula luzuloides-, Urtica dioica) - Gruppe
Waldgersten-Buchenwald mit Tanne
Mull; Mergelrendzina-Pelosol bis Pelosol, auch Kalkpelosol



Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenem Mergeltonhang

MeTH-

Mäßig trocken; sonnseitige Hanglagen

oliv
d'gelbe Schräggitter
d'gelbe Senkrechtstrichelung

Mercurialis perennis-, Milium effusum-, Lamium galeobdolon-, Carex flacca - Gruppe
Waldgersten-Buchenwald mit Tanne
Moder (Hagermoder) bis Mullmoder; Mergelrendzina bis Rendzina-Pelosol

Öko-Serie der Tonhänge

(Mehr als 40 cm plastizierter Ton über dolomitischen Mergeln des Mittleren und Unteren Muschelkalks; freies Karbonat unterhalb (40) 50 cm Tiefe; geringe schluffig-lehmige Auflage möglich)



Buchen-Tannen-Eschen-Wald auf frischem Tonhang

TH+

Frisch; Hänge und Hangmulden

oliv
d'grüne Schräggitter

Milium effusum-, Lamium galeobdolon-, Ajuga reptans-, Mercurialis perennis-, Urtica dioica - Gruppe
Waldgersten-Buchenwald mit Tanne



Buchen-Tannen-Eschen-Wald auf mäßig frischem Tonhang

TH

Mäßig frisch; Hänge

oliv
h'grüne Schräggitter

Milium effusum-, Rubus-, Lamium galeobdolon-, Ajuga reptans-, Urtica dioica-, Mercurialis perennis-, Carex flacca-, Luzula luzuloides - Gruppe
Waldmeister-Buchenwald mit Tanne, Waldmeister-Buchenwald mit Tanne, Waldgersten-Buchenwald mit Tanne
Mull bis Mullmoder, örtlich Moder; Braunerde-Pelosol bis Pelosol



Buchen-Tannen-Hainbuchen-Wald auf weidegestörtem mäßig frischem Tonhang (submontan); Buchen-Tannen-Wald auf weidegestörtem mäßig frischem Tonhang (montan)

wgTH

Mäßig frisch; flachere Hänge

oliv
h'grüne Schräggitter
d'rote liegende Achten

Vaccinium-, Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Luzula luzuloides-, Carex flacca-, Lamium galeobdolon-, (Deschampsia flexuosa-, Ajuga reptans) - Gruppe
Waldgersten-Buchenwald mit Tanne
Mull bis Mullmoder, örtlich Moder; Braunerde-Pelosol bis Pelosol

C. Extreme Standorte

Gruppe der Blockschuttdecken, Block- und Felshänge

(Meist anstehende Felsen und große Blöcke des kristallinen Grundgebirges, selten mächtigere Blockschuttdecken mit Blöcken von mehr als 20 cm Durchmesser; oft lückige, z.T. fehlende Bestockung; fließende Übergänge zu den lehmigen Steinschutthängen)



Buchen-Tannen-Bergahorn-Wald auf frischem Block- und Felshang

BIH+

d'gelb
d'grüne Schräggitter
schwarze Dreiecke leer und ausgefüllt

Frisch; schatt- und sonnseitige, meist steile Hanglagen

Ajuga reptans-, Milium effusum-, Rubus-, (Lamium galeobdolon-, Impatiens noli-tangere) - Gruppe

Eschen-Ahorn-Steinschutthangwald, Eschen-Ahorn-Steinschutthangwald, Waldmeister-Buchenwald mit Tanne - Frauenfarn, Waldmeister-Buchenwald mit Tanne - Frauenfarn

Mull bis Moder; Ranker bis Braunerde, örtlich podsolig



Buchen-Tannen-Bergahorn-Wald auf mäßig frischem Block- und Felshang

BIH

d'gelb
h'grüne Schräggitter
schwarze Dreiecke leer und ausgefüllt

Mäßig frisch; schatt- und sonnseitige, meist steile bis schroffe Hanglagen

Luzula luzuloides-, Milium effusum-, Vaccinium-, Rubus-, Urtica dioica-, (Ajuga reptans-, Blechnum spicant-, Deschampsia flexuosa) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne, Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne, Drahtschmielen-Bergahorn-Blockwald, Drahtschmielen-Bergahorn-Blockwald

Mull bis Moder; Ranker bis Braunerde, örtlich podsolig



Buchen-Taubeneichen-Wald auf trockenem Block- und Felshang

BIH-

d'gelb
d'rote Schräggitter
schwarze Dreiecke leer und ausgefüllt

Trocken bis mäßig trocken; meist sonnseitige, steile bis schroffe Hanglagen

Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, (Milium effusum-, Luzula luzuloides-, Leucobryum glaucum) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne, Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne, Hainsimsen-Taubeneichenwald, Taubeneichen-Linden-Blockwald, Taubeneichen-Linden-Blockwald

Mullmoder bis Moder, örtlich Hagerhumus; +/-podsoliger Ranker bis Ranker-Braunerde, örtlich Braunerde



Buchen-Tannen-Wald auf Blockschuttdecken

BI


d'gelb
schwarze Dreiecke leer und ausgefüllt

Mäßig frisch bis mäßig trocken; Flachlagen und Kuppen

Deschampsia flexuosa-, Vaccinium-, Ajuga reptans-, (Milium effusum-, Sphagnum angustifolium-, Blechnum spicant) - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mullmoder bis Moder, örtlich Hagerhumus; Braunerde und Ranker-Braunerde



Block- und Felshänge ohne Bestockung

BIHoB

weiß
schwarze Dreiecke leer und ausgefüllt


Trocken; mächtige Blockschutthalden und anstehende Felsen; steil bis schroff

Deschampsia flexuosa - Gruppe

Mull bis Moder, örtlich Hagerhumus; Ranker bis Braunerde-Ranker

Gruppe der trocken-sauren Hänge

(Meist devastierte, überwiegend sonnseitig exponierte, steile Hanglagen mit unterschiedlicher Bodenart, meist hoher Steinanteil; deutliche Tendenz zur Verheidung und Versauerung; starker Leistungsabfall)



Buchen-Taubeneichen-Wald auf trocken-saurem Hang

trsH

d'gelb
d'rote Schräggitter
d'rote Senkrechtstrichelung

Mäßig trocken und trocken; stark versauerte Oberhänge und Hangrücken
Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, Leucobryum glaucum - Gruppe
Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne
Moder bis Rohhumus, örtlich Hagerhumus; podsolige Braunerde und Ranker-Braunerde, selten Podsol

D. Sonstige, morphologisch bedingte Standorte

Gruppe der Rücken und Hangrücken

(Exponierte Rücken im Kristallin bis etwa 60 m Breite mit starker seitlicher Drainage; oft windausgesetzt; örtlich blockig bis felsig)




Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischen Rücken und Hangrücken

RÜ

h'grün
h'grüne Senkrechtstriche

Mäßig frisch und mäßig trocken; schmale Rücken und Hangrücken
Deschampsia flexuosa-, Milium effusum-, Vaccinium-, Ajuga reptans-, (Lamium galeobdolon-, Luzula luzuloides-, Blechnum spicant) - Gruppe
Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne
Mull bis Moder, örtlich Hagerhumus; podsolige Braunerde bis Braunerde-Ranker, z.T. Ranker-Braunerde




Buchen-Tannen-Wald auf sauren mäßig frischen Rücken und Hangrücken (submontan); Tannen-Buchen-Wald auf sauren mäßig frischen Rücken und Hangrücken (montan)

sRÜ

h'grün
orange Senkrechtstriche doppelt einfarbig

Mäßig frisch bis mäßig trocken; schmale Rücken und Hangrücken
Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, (Milium effusum-, Blechnum spicant-, Leucobryum glaucum-, Luzula luzuloides) - Gruppe
Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne
Moder bis Rohhumus; Braunerde bis Braunerde-Ranker, örtlich podsolig



Buchen-Taubeneichen-Wald auf mäßig trockenen Rücken und Hangrücken (submontan); Buchen-Taubeneichen-Tannen-Wald auf mäßig trockenen Rücken und Hangrücken (montan)

RÜ-

h'grün
orange Senkrechtstriche

Mäßig trocken, örtlich bis trocken; schmale exponierte Rücken und Hangrücken, häufig blockig und felsig
Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, (Milium effusum-, Leucobryum glaucum) - Gruppe
Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne
Hagerhumus; Ranker bis Braunerde

Gruppe der Rinnen, Talsenken und sonstigen konkaven Lagen

(In Hang- und Flachlagen im Grundgebirgs-, selten im Buntsandstein-Bereich; meist schmale, in Talsenken auch über 50 m breite Geländeformen; unterschiedliche Bodenarten, häufig kolluviale Böden)



Eschen-Bergahorn-Wald in frischen Rinnen und Senken

Ri+


d'grün

Frisch, örtlich grundfeucht; bis ca. 50 m breite Hangrinnen und Senken in Flachlagen und Unterhängen; oft mit kleinen Bachläufen; örtlich blockig

Milium effusum-, Ajuga reptans-, Urtica dioica-, Rubus-, Lamium galeobdolon-, (Mercurialis perennis-, Stachys sylvatica) - Gruppe

Ahorn-Eschenwald, Ahorn-Eschenwald, Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald, Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald

Mull bis Moder; Braunerde bis Pseudogley-Braunerde und Braunerde-Pseudogley, meist kolluvial



Schwarzerlen-Eschen-Wald in Talsenken

Ta


d'grün
blaue Dreiecke leer

Frisch, grundfeucht und feucht, selten nass; Talsenken und Auen längs der Bäche

Ajuga reptans-, Impatiens noli-tangere-, Aruncus dioicus-, Sphagnum angustifolium-, Stachys sylvatica-, (Milium effusum-, Blechnum spicant-, Luzula luzuloides-, Vaccinium) - Gruppe

Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald, Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald, Ahorn-Eschenwald

Mull, Feuchthumus; Brauner Aueboden bis Gley, auch Pseudogley-Gley



Schwarzerlen-Eschen-Wald in quelligen Lagen

qLa


h'grün
blaue Dreiecke ausgefüllt

Quellig und sicherfeucht; Hanglagen, oft im Bereich und unterhalb von Quelltöpfen

Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, Impatiens noli-tangere-, Lamium galeobdolon-, Blechnum spicant-, Juncus-, (Urtica dioica-, Milium effusum-, Luzula luzuloides-, Vaccinium) - Gruppe

Schwarzerlen-Eschenwald

Mull bis Feuchthumus, örtlich anmoorig; Quellengley und Hanggley



Eschenwald in feuchten Lagen

fLa


h'grün
blaue Punkte

Feucht, lateral durchsickert und grundfeucht; oft geneigte Flachlagen der Grundgebirgsverebnung

Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, Impatiens noli-tangere-, Urtica dioica - Gruppe

Schwarzerlen-Eschenwald

Mull bis Mullmoder; Gley und Braunerde-Gley, örtlich Anmoorgley



Fichten-Tannen-Kiefern-Wald in feucht-sauren Lagen

fsLa


blauviolett
d'rote Punkte

Nass bis feucht; wellige Flachlagen als Inseln und Randlagen im Bereich von Missen, Mooren und Senken

Vaccinium-, Sphagnum angustifolium-, Deschampsia flexuosa-, (Luzula luzuloides-, Juncus-, Rubus-, Milium effusum) - Gruppe

Beerstrauch-Tannenwald

Feuchter Rohhumus bis roher Torf; Moor-Gley bis Podsol-Pseudogley (Stagnogley)

**Bergahorn-Eschen-Schluchtwald****Schl**

blaßblau

blaue Pfeilspitze unten (V)

Frisch, vor allem hangfrisch; Hangtälchen und Unterhänge in engen Schluchten


Ajuga reptans-, Aruncus dioicus-, Stachys sylvatica-, (Impatiens noli-tangere-, Milium effusum) - Gruppe

Ahorn-Eschenwald, Eschen-Ahorn-Steinschutthangwald

Mull; Ranker bis Braunerde, stellenweise Rohboden

E. Standorte der Moore

Böden mit mindestens 3 dm mächtigen Horizonten aus organischem Bodenmaterial (Torf), gebildet aus Pflanzenresten unter Wasserüberschuss und Sauerstoffmangel

Gruppe moorgeprägte Lagen**Fichten-Tannen-Wald in wasserzügigen vermoorten Lagen****wzmLa**

Nass bis feucht; schwach geneigte, wasserzügige Lagen; kleinflächiges Standortmosaik: Wechsel von Rinnen, kleinen Senken und Kuppen; unruhiges Relief; zersetzer Torf von 20 bis 40 cm Mächtigkeit über vergleytem Mineralboden

grau

blaue Punkte

Vaccinium-, Blechnum spicant-, Luzula luzuloides-, Sphagnum angustifolium-, Ajuga reptans - Gruppe

Hainsimsen-Fichten-Tannenwald, Hainsimsen-Fichten-Tannenwald, Schwarzerlen-Eschenwald


Moostorf bis Feuchthumus; Anmoorgley bis Moorgley, auch kleinflächig Hochmoor

**Fichtenwald auf Moorrändern****MR**

Grundfeucht, feucht und nass; Abflussträge Verebnungen, Mulden und Plateaulagen; Mineralboden in 40 bis 60 cm erbohrbar

Sphagnum angustifolium-, Oxycoccus palustris-, Molinia-, Vaccinium - Gruppe
Rauschbeeren-Geißelmoos-Fichtenwald

Torf, Anmoor und Feuchthumus; Moor-Gley, Anmoor-Gley, Moor-Stagnogley


Gruppe der Moore**Fichtenwald in vermoorten Senken****mSe**

Feucht, grundfeucht und nass, (mehr oder weniger schwach wasserzügig); meist über 50 m breite Tallagen und Senken; wechselnd mächtige Moostorfaulagen (bis max. 60 cm)

Blechnum spicant-, Sphagnum angustifolium-, Stachys sylvatica-, (Deschampsia flexuosa-, Juncus) - Gruppe

Rauschbeeren-Geißelmoos-Fichtenwald, Rauschbeeren-Geißelmoos-Fichtenwald

Torf, Feuchthumus; Moorgley, örtlich Anmoorgley, auch Übergänge zu Hochmoor



d'grün
graue Punkte

Moorbirken-Schwarzerlen-Wald auf Niedermoor


NM

Feucht und nass, (schwach wasserzügig); breite Flachsenken; über 60 cm mächtiger, tiefschwarzer Niedermoortorf

Iris pseudacorus-, Stachys sylvatica-, Impatiens noli-tangere-, Lamium galeobdolon-, (Molinia-, Oxycoccus palustris-, Sphagnum angustifolium-, Juncus) - Gruppe

Ohrweiden-Moorbirkenwald, Torfmoos-Moorbirken-Erlenbruchwald

Niedermoor- (Seggen-) Torf; Niedermoor



grau
blaue Querstrichelung

Fichtenwald auf Zwischenmoor


ZM

Nass; nur wenig geneigte Lagen, ausgeglichenes Relief; Torf unterschiedlicher Zusammensetzung, zumindest im Unterboden als Seggentorf ansprechbar

Vaccinium-, Sphagnum angustifolium-, Blechnum spicant-, (Luzula luzuloides) - Gruppe

Geißelmoos-Fichtenwald, Rauschbeeren-Geißelmoos-Fichtenwald,
Rauschbeeren-Geißelmoos-Fichtenwald, Geißelmoos-Fichtenwald

Teilweise zersetzer Zwischenmoortorf; Zwischenmoor



grau
schwarze Pfeilspitze oben (umgedr. V)

Fichten-Spirken-Wald auf bestocktem Hochmoor

bHM

Nass bis feucht, (teilentwässert); Bestockte Hochmoorflächen; wuchsschwache Fichte und Spirke noch bestandesbildend; wenig zersetzer Hochmoortorf

Vaccinium-, Sphagnum angustifolium-, Oxycoccus palustris-, Leucobryum glaucum - Gruppe

Rauschbeeren-Bergkiefern-Moorwald, Rauschbeeren-Geißelmoos-Fichtenwald

Wenig zersetzer Hochmoortorf; Hochmoor



grau

Hochmoor


HM

Nass, (z.T. entwässert, abflusslos); Unbestockte Ebenen und breite Flachsenken; unzersetzte Torfschichten über 60 cm

Sphagnum angustifolium-, Oxycoccus palustris-, Molinia-, Vaccinium - Gruppe

Rauschbeeren-Bergkiefern-Moorwald, Rauschbeeren-Bergkiefern-Moorwald,
Rauschbeeren-Geißelmoos-Fichtenwald, Rauschbeeren-Geißelmoos-Fichtenwald

Hochmoortorf; Hochmoor, auch Quellmoor



grau
schwarze Senkrechtstrichelung

Kiefern-Fichten-Wald auf Hochmoor in Mineralisierung (submontan); Fichtenwald auf Hochmoor in Mineralisierung (montan)

HMm

Nass; Mulden und Flachhänge mit einer über 60 cm mächtigen Auflage weitgehend zersetzenen Torfs

Vaccinium-, Blechnum spicant-, Sphagnum angustifolium-, Ajuga reptans-, (Luzula luzuloides-, Deschampsia flexuosa-, Oxycoccus palustris) - Gruppe

Geißelmoos-Fichtenwald, Rauschbeeren-Geißelmoos-Fichtenwald,
Geißelmoos-Fichtenwald, Rauschbeeren-Geißelmoos-Fichtenwald

Zersetzer Hochmoortorf; Hochmoor



grau

Hochmoor (historisch)

HM(his)

Waldfläche (nach ATKIS DLM) [ha]:	20515
standortskartierte und digitalisierte Fläche [ha]:	16982