



Forstliche Versuchs-  
und Forschungsanstalt  
Baden-Württemberg



## Waldökologische Standortskartierung

# Regionallegende

Wuchsgebiet:	3	Schwarzwald
Einzelwuchsbezirk:	3/07	Mittlerer Schwarzwald zwischen Kinzig und Schwarzwaldhochstraße
Zonalwald:	Kolliner Buchenwald mit Bergahorn	

Ausgabestand: 21.02.2024

# Erklärung der Legendenzeilen



In grau dargestellte Standortseinheiten stammen aus Kartierungen die wiederholt werden müssen. Historische Regionale Standortseinheiten sind am 'his' im Sigel erkennbar. Diese Standortseinheiten sind veraltet und werden nicht mehr kartiert, sie besitzen keine Beschreibung der Zeilen.

## Fachbearbeitung

Bei Fragen oder Nachbestellungen wenden Sie sich bitte an die:

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
Abt. Waldnaturschutz  
Wonnhaldestr. 4  
79100 Freiburg

E-Mail: Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de  
Telefon: 0761 / 4018 – 0

## Datenbank Management



IDaMa GmbH

Zasiusstr. 77  
79102 Freiburg

www.idama.de

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
Abt. Waldnaturschutz  
Wonnhaldestr. 4  
79100 Freiburg  
Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

[www.fva-bw.de](http://www.fva-bw.de)


## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

## A. Standorte der ebenen und schwach geneigten Lagen

### Öko-Serie der tiefgründigen grusigen Lehm Böden

(Tiefgründige, mehr als 60 cm bohrbare, steinarme bis steinfreie lehmige Böden mit wechselndem Sand- und Grusgehalt)




satt'h'braun  
h'grüne X-se

**Buchenwald auf mäßig frischem grusigem Lehm Boden**

**kgL**

Mäßig frisch; Flachlagen

Milium effusum-, Luzula luzuloides-, Deschampsia flexuosa - Gruppe  
Waldmeister-Buchenwald mit Tanne  
Mull bis Mullmoder; Braunerde bis Parabraunerde




satt'h'braun  
orange Senkrechtstrichelung  
h'grüne X-se

**Buchenwald auf saurem mäßig frischem grusigem Lehm Boden (nicht typisch)**

**ksgL**

Mäßig frisch; Flachlagen

Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, Vaccinium-, Milium effusum - Gruppe  
Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne  
Moder; Braunerde




satt'h'braun  
orange X-se

**Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenem grusigem Lehm Boden**

**kgL-**

Mäßig trocken; Flachlagen

Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, Vaccinium-, Leucobryum glaucum - Gruppe  
Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne  
Moder, teils verhagert; podsolige Braunerde



satt'h'braun  
d'rote Senkrechtstrichelung  
orange X-se

**Buchen-Traubeneichen-Wald auf saurem mäßig trockenem grusigem Lehm Boden**


**ksgL-**

Mäßig trocken; Flachlagen

Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, Leucobryum glaucum-, Luzula luzuloides - Gruppe  
Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne  
Moder bis Rohhumus; podsolige Braunerde bis Braunerde-Podsol

### Öko-Serie der lehmigen Grusböden

(Mittel- bis tiefgründige, mind. 40 cm tiefe, durchläss., +/- steinige, lehmig-sandig-grusige Böden aus Gneis-, seltener Granitverwitt.; auf Gneis stärker steinig u. schluffig-lehmig, auf Granit deutl. grusig mit geringem Stein- u. Lehmgehalt; Steingehalt nach unten zunehmend)




bläß'h'braun  
h'grüne Senkrechtstrichelung

**Buchenwald auf mäßig frischem lehmigem Grusboden**

**kiG**

Mäßig frisch; Flachlagen

Milium effusum-, Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, Ajuga reptans - Gruppe  
Waldmeister-Buchenwald mit Tanne  
Mull bis Mullmoder; Braunerde



bläß'h'braun  
h'braune Senkrechtstrichelung

**Buchenwald auf saurem mäßig frischem lehmigem Grusboden**


**ksIG**

Mäßig frisch bis örtlich mäßig trocken; Flachlagen

Deschampsia flexuosa-, Vaccinium-, Luzula luzuloides-, Milium effusum - Gruppe  
Moder; Braunerde bis schwach podsolige Braunerde

## Öko-Serie der lehmigen Steinschuttböden

(Flach- bis mittelgründige, i. d. R. bis 40 cm bohrbare, stark steinige, grusige Gneisverwitterung mit geringen Lehmantteilen im Oberboden; im Unterboden oft höherer Lehmgehalt; z.T. eingegengter Wurzelraum)




blaßh'braun  
schwarze Senkrechtstrichelung

### Buchenwald auf mäßig frischem lehmigem Steinschuttboden

**kISt**

Mäßig frisch; Bergkuppen und flache Oberhänge

Milium effusum-, Luzula luzuloides-, Deschampsia flexuosa - Gruppe  
Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne, Waldmeister-Buchenwald mit Tanne  
Mull bis Mullmoder; Braunerde




blaßh'braun  
h'braune Senkrechtstrichelung doppelt  
schwarz/

### Buchenwald auf saurem mäßig frischem lehmigem Steinschuttboden

**ksISt**

Mäßig frisch; Bergkuppen und flache Oberhänge

Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides - Gruppe  
Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne  
Moder; Braunerde und podsolige Braunerde



blaßh'braun  
orange Senkrechtstrichelung doppelt  
schwarz/

### Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenem lehmigem Steinschuttboden


**kISt-**

Mäßig trocken; Bergkuppen und flache Oberhanglagen

Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, (Leucobryum glaucum) - Gruppe  
Moder bis plattiger Hagerhumus; podsolige bis podsolierte Braunerde, oft gering entwickelt

## Öko-Serie der Grundgebirgs-Mischlehme

(Mittel- bis tiefgründige, grusig-sandige, schluffige Lehme, mit der Tiefe zunehmend steinig, über steinig-grusig-sandiger Kristallin-, meist Gneisverwitterung; örtlich auch 30 bis 60 cm Feinlehmauflage)




satt'h'braun  
d'grüne Punkte

### Buchen-Eschen-Bergahorn-Wald auf frischem Grundgebirgs-Mischlehm (nicht typisch)

**GML+**

Frisch; muldige Hangfußlagen

Ajuga reptans-, Impatiens noli-tangere-, Stachys sylvatica-, Milium effusum - Gruppe  
Waldmeister-Buchenwald mit Tanne  
Mull; Braunerde



satt'h'braun  
h'grüne Punkte

### Buchenwald auf mäßig frischem Grundgebirgs-Mischlehm

**GML**

Mäßig frisch; flach geneigte bis ebene Hangfußlagen

Milium effusum-, Luzula luzuloides-, Deschampsia flexuosa-, Ajuga reptans - Gruppe  
Waldmeister-Buchenwald mit Tanne  
Mull; Braunerde

## Öko-Serie der nicht vernässenden Feinlehme

(Tiefgründige, über 60 cm mächtige, entkalkte Schlufflehmdecken, meist Lösslehme, über durchlässiger Kristallinverwitterung)



satt'h'braun  
d'grüne Senkrechtstriche

### Buchen-Eschen-Bergahorn-Wald auf frischem Feinlehm

**FL+**

Frisch; muldige Hangfußlagen

Ajuga reptans-, Impatiens noli-tangere-, Stachys sylvatica-, Milium effusum - Gruppe  
Waldmeister-Buchenwald mit Tanne  
Mull; Parabraunerde und Braunerde



satt'h'braun

### Buchenwald auf mäßig frischem Feinlehm


**FL**

Mäßig frisch; schwach geneigte und ebene Hangfußlagen

Milium effusum-, Ajuga reptans-, Luzula luzuloides-, Deschampsia flexuosa - Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Mull; humose Parabraunerde



satt'h'braun

d'rote Senkrechtrichelung

### Buchenwald auf saurem mäßig frischem Feinlehm

**sFL**

Mäßig frisch; flach geneigte bis ebene Unterhanglagen

Deschampsia flexuosa-, Vaccinium-, Luzula luzuloides-, Milium effusum - Gruppe


Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne, Waldmeister-Buchenwald mit Tanne - Frauenfarn

Moder; Parabraunerde, mehr oder weniger podsolig

## B. Standorte der steileren Hänge

### Öko-Serie der grusigen Lehmhänge

(Tiefgründige, mehr als 60 cm bohrbare, steinarme bis steinfreie lehmige Böden mit wechselndem Sand- und Grusanteil über Kristallinverwitterung)



satt'h'braun

d'grüne Schräggitter

d'grüne Querstrichelung

### Buchen-Eschen-Bergahorn-Wald auf frischem grusigem Lehmhang


**gLH+**

Frisch; Hangmulden, Unterhänge und Dobellagen

Ajuga reptans-, Impatiens noli-tangere-, Stachys sylvatica-, Luzula luzuloides - Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Mull; Braunerde



satt'h'braun

h'grüne Schräggitter

h'grüne Querstrichelung

### Buchenwald auf mäßig frischem grusigem Lehmhang


**gLH**

Mäßig frisch; Hanglagen

Milium effusum-, Ajuga reptans-, Luzula luzuloides-, Stachys sylvatica-, Deschampsia flexuosa - Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Mull; Braunerde



satt'h'braun

h'grüne Schräggitter

orange Querstrichelung

### Buchenwald auf saurem mäßig frischem grusigem Lehmhang

**sgLH**

Mäßig frisch; schattseitige Hanglagen

Deschampsia flexuosa-, Vaccinium-, Luzula luzuloides-, Milium effusum - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Moder; podsolige Braunerde



satt'h'braun

h'braune Schräggitter

h'braune Querstrichelung

### Buchenwald auf mäßig frischem sonnseitigem grusigem Lehmhang


**sogLH**

Mäßig frisch; sonnseitige Hanglagen

Milium effusum-, Luzula luzuloides-, Deschampsia flexuosa - Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Mullmoder; Braunerde



**Buchenwald auf saurem mäßig frischem sonnseitigem grusigem Lehmland (nicht typisch)**

**ssogLH**

satt'h'braun  
h'braune Schräggitter  
orange Querstichelung


Mäßig frisch, örtlich trocken; Örtlich saure mittlere und obere Hanglagen; meist ehem. Reutberge

Deschampsia flexuosa-, Vaccinium-, Luzula luzuloides-, (Miliium effusum-, Blechnum spicant-, Ajuga reptans-, Molinia) - Gruppe

Moder, selten rohhumusartiger Moder; ± podsolige Braunerde

## Öko-Serie der lehmigen Grushänge

(Mittel- bis tiefgründige, mindestens 40 cm tiefe, durchlässige, ±steinige, lehmig-sandig-grusige Böden aus Gneis-, seltener Granitverwitterung)



**Buchen-Eschen-Bergahorn-Wald auf frischem lehmigem Grushang**

**IGH+**


blaß'h'braun  
d'grüne Schräggitter  
d'braune Senkrechtstichelung

Mäßig frisch; Hanglagen

Ajuga reptans-, Impatiens noli-tangere-, Miliium effusum-, (Stachys sylvatica-, Aruncus dioicus) - Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Mull; Braunerde



**Buchenwald auf mäßig frischem lehmigem Grushang**

**IGH**


blaß'h'braun  
h'grüne Schräggitter  
h'grüne Senkrechtstichelung

Mäßig frisch; schattseitige Hänge

Ajuga reptans-, Miliium effusum-, Luzula luzuloides-, Deschampsia flexuosa - Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Mullmoder; Braunerde



**Buchenwald auf saurem mäßig frischem lehmigem Grushang**

**sIGH**


blaß'h'braun  
h'grüne Schräggitter  
orange Senkrechtstichelung

Mäßig frisch; überwiegend schattseitige Hanglagen

Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, Ajuga reptans-, Miliium effusum - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Moder; podsolige Braunerde



**Buchenwald auf mäßig frischem sonnseitigem lehmigem Grushang**

**soIGH**

blaß'h'braun  
h'braune Schräggitter  
h'braune Senkrechtstichelung

Mäßig frisch; sonnseitige Hanglagen mit sommerlicher Austrocknung

Luzula luzuloides-, Deschampsia flexuosa-, Miliium effusum-, Ajuga reptans - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne, Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Mullmoder; Braunerde



**Buchenwald auf saurem mäßig frischem sonnseitigem lehmigem Grushang**

**ssolGH**

blaß'h'braun  
h'braune Schräggitter  
orange Senkrechtstichelung


Mäßig frisch; sonnseitige Hanglagen mit sommerlicher Austrocknung

Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, Vaccinium-, Miliium effusum - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Moder; podsolige Braunerde





blaßh'braun  
orange Schräggitter  
orange Senkrechtstrichelung

### Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenem lehmigem Grushang


**IGH-**

Mäßig trocken; flachgründige Oberhänge und Rückenrandlagen

Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, Milium effusum-, Vaccinium - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Moder; mäßig podsolige Braunerde



blaßh'braun  
d'rote Schräggitter

### Buchen-Traubeneichen-Wald auf saurem mäßig trockenem lehmigem Grushang

**sIGH-**


Mäßig trocken; flachgründige, überwiegend sonnseitige Oberhänge und Rückenrandlagen

Vaccinium-, Leucobryum glaucum-, Deschampsia flexuosa - Gruppe

Moder und Hagerhumus; Podsol-Braunerde

## Öko-Serie der lehmigen Steinschutthänge

(Flach- bis mittelgründiger, maximal 40 cm bohrbarer, lehmig-grusiger Steinschuttboden, teils lehmig-grusige Verwitterung über der Steinschuttlage, teils oberflächlich dichtgepackte Steinschuttdecke; Wurzelraumbegrenzung; meist auf Gneis, seltener auf Granit)



blaßh'braun  
d'grüne Schräggitter  
schwarze Senkrechtstrichelung

### Buchen-Eschen-Bergahorn-Wald auf frischem lehmigem Steinschutthang


**ISth+**

Frisch; Unterhänge und Dobel, Hangmulden

Ajuga reptans-, Impatiens noli-tangere-, Stachys sylvatica-, Milium effusum - Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Mull; Braunerde



blaßh'braun  
h'grüne Schräggitter  
schwarze Senkrechtstrichelung

### Buchenwald auf mäßig frischem lehmigem Steinschutthang

**ISth**

Mäßig frisch; Hänge

Milium effusum-, Deschampsia flexuosa-, (Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, Urtica dioica) - Gruppe

Mull bis Mullmoder; Braunerde



blaßh'braun  
h'braune Schräggitter  
schwarze Senkrechtstrichelung

### Buchenwald auf mäßig frischem sonnseitigem lehmigem Steinschutthang


**solStH**

Mäßig frisch; Hanglagen

Ajuga reptans-, Impatiens noli-tangere-, Stachys sylvatica-, Milium effusum - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mullmoder; Braunerde



blaßh'braun  
h'braune Schräggitter  
orange Senkrechtstrichelung doppelt  
schwarz/

### Buchenwald auf saurem mäßig frischem sonnseitigem lehmigem Steinschutthang


**ssolStH**

Mäßig frisch; sonnseitige Hanglagen

Deschampsia flexuosa-, Vaccinium-, Luzula luzuloides-, Milium effusum - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Moder; podsolige bis podsolierte Braunerde



blaßh'braun  
orange Schräggitter  
schwarze Senkrechtstrichelung

### Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenem lehmigem Steinschutthang

**ISth-**

Mäßig trocken; konvexe, meist sonnseitig exponierte Oberhänge


Deschampsia flexuosa-, Vaccinium-, Luzula luzuloides-, Leucobryum glaucum-, Milium effusum - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Moder, oft Hagerhumus; podsolige Braunerde

## Öko-Serie der Grundgebirgs-Mischlehmhänge

(Mittel- bis tiefgründige, +- steinarmer, schluffige Lehme mit wechselndem Grus-, Sand- und Feinlehmanteil über steinig-grusig-sandiger Kristallin-, meist Gneisverwitterung)



satt'h'braun  
h'grüne Schräggitter  
h'grüne Punkte

### Buchenwald auf mäßig frischem Grundgebirgs-Mischlehmhang


**GMLH**

Mäßig frisch bis hangfrisch; mäßig steile Unterhänge

Milium effusum-, Luzula luzuloides-, Deschampsia flexuosa-, Ajuga reptans - Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Mullmoder; Braunerde



satt'h'braun  
orange Schräggitter  
h'grüne Punkte

### Buchenwald auf saurem mäßig frischem Grundgebirgs-Mischlehmhang

**sGMLH**

Mäßig frisch bis örtlich mäßig trocken; Hanglagen, überwiegend sonnseitig exponiert


Deschampsia flexuosa-, Vaccinium-, Luzula luzuloides-, Ajuga reptans - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mullmoder bis rohhumusartiger Moder; podsolige Braunerde

## Öko-Serie der Feinlehmhänge

(Tiefgründige, über 50 bis 60 cm mächtige Schlufflehmauflagen über durchlässiger Kristallinverwitterung)



satt'h'braun  
h'grüne Schräggitter

### Buchenwald auf mäßig frischem Feinlehmhang


**FLH**

Mäßig frisch bis hangfrisch; mäßig steile Unterhänge, meist schattseitig

Milium effusum-, Luzula luzuloides-, Deschampsia flexuosa-, Ajuga reptans - Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Mull; Parabraunerde



satt'h'braun  
h'grüne Schräggitter  
d'rote Senkrechtstrichelung

### Buchenwald auf saurem mäßig frischem Feinlehmhang

**sFLH**

Mäßig frisch; mäßig steile, ortsnaher Unterhänge

Deschampsia flexuosa-, Vaccinium-, Luzula luzuloides-, Milium effusum - Gruppe

Moder; Parabraunerde

## C. Standorte der extremen Hänge

### Gruppe der Block- und Felshänge im Grundgebirge

(Felspartien und Blockanhäufungen im Gneisbereich; ständiger Wechsel von Kleinstandorten; fließende Übergänge zu den Steinschutthängen)



d'gelb  
h'grüne Schräggitter  
schwarze Dreiecke leer und ausgefüllt


### Bergahorn-Schwarzerlen-Wald auf mäßig frischem Block- und Felshang

**kBIH**

Mäßig frisch; Hänge

Milium effusum-, Luzula luzuloides-, Ajuga reptans-, Vaccinium-, Urtica dioica-, Deschampsia flexuosa-, (Blechnum spicant) - Gruppe

Mull; Braunerde



d'gelb  
d'rote Schräggitter  
schwarze Dreiecke leer und ausgefüllt

### Bergahorn-Traubeneichen-Birken-Wald auf mäßig trockenem Block- und Felshang

**kBIH-**

Mäßig trocken bis trocken; Hänge

Deschampsia flexuosa-, Vaccinium-, Leucobryum glaucum-, (Milium effusum) - Gruppe

Hagerhumus; mäßig podsolige Braunerde, stellenweise Ranker-Braunerde



## D. Sonstige, morphologisch bedingte Standorte

### Gruppe der Rücken und Kuppen im Grundgebirge

(Exponierte Rücken und Kuppen mit erhöhter Windbelastung und starkem seitlichem Wasserzug)



h'gelb  
h'grüne Senkrechtriche

**Buchenwald auf mäßig frischem Grundgebirgsrücken**


**kRü**

Mäßig frisch, örtlich mäßig trocken; Rücken und Hangrücken; überwiegend mittelgründig

Milium effusum-, Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, Vaccinium-, Ajuga reptans - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Mull bis Mullmoder; Braunerde



h'gelb  
orange Senkrechtriche

**Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenen Grundgebirgs-Rücken**

**kRü-**

Mäßig trocken; flachgründige Bergkuppen und Hangrücken

Deschampsia flexuosa-, Vaccinium-, Leucobryum glaucum-, Luzula luzuloides - Gruppe

Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne

Moder bis rohhumusartiger Moder; podsolige Braunerde bis Podsol-Braunerde

### Gruppe der Rinnen, Bachtäler und Senken

(In Hang- und Flachlagen, selten über 50 m breit, häufig mit kleineren Bachläufen; unterschiedliche Bodenarten, meist kolluvial entstanden)



d'grün

**Bergahorn-Eschen-Wald in frischen Rinnen und Senken**

**kRi**


Frisch bis grundfeucht; Hangrinnen und breite Mulden längs von Bachläufen

Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, Impatiens noli-tangere-, Milium effusum - Gruppe

Ahorn-Eschenwald, Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Mull; humose kolluviale Braunerde bis Gley-Braunerde

### Gruppe quellige und feuchte Lagen



d'grün  
blaue Querstriche

**Bergahorn-Eschen-Wald in grundfeuchten Lagen**


**kgfLa**

Grundfeucht bis quellig; etwas abzugsträge Lagen, meist hängig

Ajuga reptans-, Milium effusum-, Luzula luzuloides-, (Blechnum spicant) - Gruppe

Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Mull, örtlich Feuchthumus; Gley-Braunerde bis Braunerde-Gley



d'grün  
blaue Dreiecke ausgefüllt

**Schwarzerlen-Eschen-Wald in quelligen Lagen**

**kqLa**

Quellig bis sickerfeucht; Lagen, überwiegend am Quellhorizont

Impatiens noli-tangere-, Luzula luzuloides-, Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, Blechnum spicant - Gruppe

Schwarzerlen-Eschenwald

Mull bis Moder, örtlich Feuchthumus; Quellengley und Hanggley

Waldfläche (nach ATKIS DLM) [ha]: 997  
standortskartierte und digitalisierte Fläche [ha]: 930