

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/02al Kinzig-Murg-Rinne

Standortskundliche Höhenstufe

planar

Höhenverbreitung (Wald)

109 (88 bis 159) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

10,2 Ø Temp. / Jahr [°C]

16,9 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


759 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

362 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

bDS

**Buchenwald auf basenreichem mäßig frischem
Dünensand**



d'gelb
d'braune Punkt, unten halbiert
schwarze Fuchsgesicht

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch

in der

Öko-Serie der Dünensande

(Zu Dünen aufgehäufte, lockere, gleichkörnige, mindestens 40 cm mächtige, meist deutlich tiefer entkalkte Mittel- und Feinsande (pleistozäne, selten holozäne äolische Sedimente), z.T. schwach lehmig; dünne Parabraunerde-Bänderung im tieferen Unterboden möglich; randlich auch Flugsanddecken)

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Standorte ohne oder mit nur geringem zeitweiligem, episodischem Grundwassereinfluss meist flache nicht exponierte Dünenareale; Verbraunungstiefe bis 70 cm; kalkfrei bis mindestens 40 cm |
| | Bodentyp | Braunerde und Bänder-Parabraunerde |
| | Humusform | Mull, selten Mullmoder |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | ohne Podsoligkeitsmerkmale |
| | Rutschgefährdung | keine Eingabe |
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Standorte ohne oder mit nur geringem zeitweiligem, episodischem Grundwassereinfluss meist flache nicht exponierte Dünenareale; Verbraunungstiefe bis 70 cm; kalkfrei bis mindestens 40 cm |
| | Bodentyp | Braunerde und Bänder-Parabraunerde |
| | Humusform | Mull, selten Mullmoder |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | ohne Podsoligkeitsmerkmale |
| | Rutschgefährdung | keine Eingabe |
| vegetation | Ökologische Artengruppen | Milium effusum-, Carex brizoides-, Lamium galeobdolon-, Rubus-, Urtica dioica-, Ajuga reptans-, (Luzula luzuloides) - Gruppe |
| | Aufnahmen | 4 Vegetationsaufnahmen (2017 bis 2019) |
| | | |

| | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|
| V Vegetation | Natürliche Waldgesellschaft | |
| | Ökologische Artengruppen | Milium effusum-, Carex brizoides-, Lamium galeobdolon-, Rubus-, Urtica dioica-, Ajuga reptans-, (Luzula luzuloides) - Gruppe |
| | Aufnahmen | 4 Vegetationsaufnahmen (2017 bis 2019) |
| | Natürliche Waldgesellschaft | |

| | | |
|------------------------------------|---------------------------|----------|
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Rotbuche |
| | Nebenbaumart(en) | |
| | Pionierbaumart(en) | |
| | | |
| | Hauptbaumart(en) | Rotbuche |
| | Nebenbaumart(en) | |
| Baumarten des Standortswald | Pionierbaumart(en) | |
| | | |

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|
| Baumarteneignung | | |
| | sonstige Laubbaumarten | - |
| | sonstige Nadelbaumarten | - |
| | | |
| Baumarteneignung | | |
| | sonstige Laubbaumarten | - |
| | sonstige Nadelbaumarten | - |
| | | |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Vorkommen | Fläche der Standortseinheit | 3,8 ha |
| | Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende | gelegentlich/zerstreut (0,28 %) |
| | Fläche der Standortseinheit | 3,8 ha |
| | Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende | gelegentlich/zerstreut (0,28 %) |
| Organisatorisch | Link zur Regionallegende | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_02al_planar.pdf |
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_02al_planar.pdf |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_02al_planar.pdf |
| | Zugehörige Kartierobjekte | 10071 |
| | Link zur Regionallegende | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_02al_planar.pdf |
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_02al_planar.pdf |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_02al_planar.pdf |
| | Zugehörige Kartierobjekte | 10071 |

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, www.idama.de
 Freiburg