

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/02a1 Kinzig-Murg-Rinne

Standortskundliche Höhenstufe

planar

Höhenverbreitung (Wald)

109 (88 bis 159) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

10,2 Ø Temp. / Jahr [°C]

16,9 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


759 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

362 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

fkrL

Eschen-Schwarzerlen-Wald auf feuchtem kalkreichem Lehm



bläßh'braun
blaue Punkte
d'braune Dreiecke ausgefüllt

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Feucht

in der

Gruppe der grundwasserbeeinflussten kalkreichen Lehme

(Grundwasserbeeinflusster, mehr als 30 (40) cm mächtiger, (fein-)sandiger, teils lehmiger, kalkiger Schluff bis (fein-) sandiger Lehm (äolischer und umgelagerter Löß) über Rohlöß, teils über Dünensand, sowie fluviatil verlagerter, (bis zur Oberfläche) kalkiger, tonig-schluffiger bis toniger Lehm; teils über stark kiesigem Sand und Kies; freier Kalk ab 0 bis 40 cm Bodentiefe)

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Standorte mit Grundwassereinfluss flache Senken, Mulden und Schluten; örtlich torfgründig |
| | Bodentyp | Gley, Kalkpaternia-Gley |
| | Humusform | L-Mull und Feuchtmull |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | ohne Podsoligkeitsmerkmale |
| | Rutschgefährdung | keine Eingabe |
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Standorte mit Grundwassereinfluss flache Senken, Mulden und Schluten; örtlich torfgründig |
| | Bodentyp | Gley, Kalkpaternia-Gley |
| | Humusform | L-Mull und Feuchtmull |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | ohne Podsoligkeitsmerkmale |
| | Rutschgefährdung | keine Eingabe |
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | Urtica dioica-, Ajuga reptans-, Carex acutiformis-, Impatiens noli-tangere-, Lamium galeobdolon-, Filipendula ulmaria-, Carex brizoides-, Stachys sylvatica-, Rubus - Gruppe |
| | Aufnahmen | 3 Vegetationsaufnahmen (2019) |
| | Natürliche Waldgesellschaft | |

| | | |
|-------------------|------------------------------------|--|
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | Urtica dioica-, Ajuga reptans-, Carex acutiformis-, Impatiens noli-tangere-, Lamium galeobdolon-, Filipendula ulmaria-, Carex brizoides-, Stachys sylvatica-, Rubus - Gruppe |
| | Aufnahmen | 3 Vegetationsaufnahmen (2019) |
| | Natürliche Waldgesellschaft | |

| | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Gemeine Esche, Schwarzerle (Roterle) |
| | Nebenbaumart(en) | |
| | Pionierbaumart(en) | |
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Gemeine Esche, Schwarzerle (Roterle) |
| | Nebenbaumart(en) | |
| | Pionierbaumart(en) | |

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|
| Baumarteneignung | sonstige Laubbaumarten | - |
| | sonstige Nadelbaumarten | - |
| | | |
| Baumarteneignung | sonstige Laubbaumarten | - |
| | sonstige Nadelbaumarten | - |
| | | |

| | | |
|------------------------|--|---|
| Vorkommen | Fläche der Standortseinheit | 4,8 ha |
| | Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende | gelegentlich/zerstreut (0,35 %) |
| | Fläche der Standortseinheit | 4,8 ha |
| | Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende | gelegentlich/zerstreut (0,35 %) |
| Organisatorisch | Link zur Regionallegende | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_02al_planar.pdf |
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_02al_planar.pdf |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_02al_planar.pdf |
| | Zugehörige Kartierobjekte | 10071 |
| | Link zur Regionallegende | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_02al_planar.pdf |
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_02al_planar.pdf |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_02al_planar.pdf |
| | Zugehörige Kartierobjekte | 10071 |

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, www.idama.de
 Freiburg