

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/03al Staubereiche der ehemaligen Rheinaue

Standortskundliche Höhenstufe

planar

Höhenverbreitung (Wald)

153 (112 bis 201) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

10,2 (10-10,4) Ø Temp. / Jahr [°C]

16,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


824 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

421 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

HHgfk

Eschen-Bergahorn-Wald auf grundfeuchtem Kies der Hohen Hartholzaue



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Grundfeucht (bis mäßig frisch)

h'gelb
h'grüne Senkrechtstriche
schwarze Kringlel (systematisch verteilt)

in der


Gruppe der Sande und Kiese der Hohen Hartholzaue (HHA)

(Kiesig sandige Standorte der Hohen Hartholzaue. Mittlere Überflutungsdauer (1.4.-30.9.): 1- 2 Tage)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standorte der Hohen Hartholzaue Tief lagen mit Kies in < 4 dm Tiefe
	Bodentyp	Gley-Auenpararendzina
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Anemone nemorosa-, Circaea lutetiana-, Urtica dioica-, Convallaria majalis-, Rubus caesius - Gruppe
	Aufnahmen	13 Vegetationsaufnahmen (2004)
	Natürliche Waldgesellschaft	Eschen-Ulmen-Wald (typisch)
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Gemeine Esche, Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	Feldahorn, Feldulme, Flatterulme, Hainbuche (Weißbuche), Silberpappel, Stieleiche, Traubenkirsche, Winterlinde
	Pionierbaumart(en)	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet bis möglich (g/m)	Es	1	2	2	
		BAh	1	2	2	
		HBu	2	2	1	2
	möglich (m)	SAh	2	2	2	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	StEi	3	2	1	2
	wenig geeignet (w)	SiWei	3	2	2	2
		FIUI	3	2	2	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	SPa	3	2	2	3
		RBu	3	2	3	2
	ungeeignet (u)	VKir	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	FAh, FeUI, SiPa, TrKir, WLi				
	sonstige Nadelbaumarten	-				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	26,4 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,43 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	29,8 %		
		2000-09	-	70,2 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_03alpha_planar.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_03alpha_planar.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_03alpha_planar.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	9921, 10022				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, www.idama.de