

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/03al Staubereiche der ehemaligen Rheinaue

Standortskundliche Höhenstufe

planar

Höhenverbreitung (Wald)

153 (112 bis 201) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

10,2 (10-10,4) Ø Temp. / Jahr [°C]

16,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


824 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

421 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

OHgfsI

Eschen-Bergahorn-Wald auf grundfeuchtem tiefgründigem Schlick der Obersten Hartholzaue



h'braun
h'grüne Senkrechtstriche

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Grundfeucht

in der

Gruppe der Schlicke der Obersten Hartholzaue (OHA)

(Schluffig-lehmige Schlickstandorte der Obersten Hartholzaue. Mittlere Überflutungsdauer (1.4.-30.9.): < 1 Tag; max. Überflutungsdauer: 5 Tage)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standorte der Obersten Hartholzaue und der Altaue Flachlagen mit Schlickauflagen > 7 dm
	Bodentyp	Gley-Kalkpaternia
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Circaea lutetiana-, Anemone nemorosa-, Urtica dioica-, Rubus caesius-, Convallaria majalis-, (Ranunculus ficaria) - Gruppe
	Aufnahmen	5 Vegetationsaufnahmen (2003 bis 2009)
	Natürliche Waldgesellschaft	Eschen-Ulmen-Wald (typisch); stellenweise Ahorn-Eschenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Gemeine Esche, Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	Feldahorn, Feldulme, Flatterulme, Hainbuche (Weißbuche), Rotbuche, Spitzahorn, Stieleiche, Traubenkirsche, Vogelkirsche
	Pionierbaumart(en)	

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	SPa	2	2	2	1
		SAh	2	2	2	1
		BAh	1	2	2	1
		HBu	2	2	1	1
	möglich (m)	FIUI	2	2	2	2
		StEi	3	2	1	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	VKir	3	2	2	1
		RBu	2	2	2	2
	wenig geeignet (w)	SiWei	3	2	2	2
	sonstige Laubbaumarten	FAh, FeUI, TrKir, WLi, WNuß				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	60,3 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,99 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 1,7 %
		2000-09 - 98,3 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_03alpha_planar.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_03alpha_planar.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_03alpha_planar.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9921, 10012, 10057

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, www.idama.de