

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/03al Staubereiche der ehemaligen Rheinaue

Standortskundliche Höhenstufe

planar

Höhenverbreitung (Wald)

153 (112 bis 201) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

10,2 (10-10,4) Ø Temp. / Jahr [°C]

16,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


824 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

421 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

gfk

Eschen-Bergahorn-Hainbuchen-Wald auf grundfeuchtem Kies



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Grundfeucht (bis mäßig frisch)

d'gelb
h'grüne Senkrechtstriche
schwarze Kringlel (systematisch verteilt)


in der

Gruppe der Sande und Kiese der Altaue und der Obersten Hartholzau (OHA)

(Kiesig-sandige Standorte der Altaue und der Obersten Hartholzau)

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Standorte der Obersten Hartholzau und der Altaue Böden mit Kies in < 4 dm Tiefe |
| | Bodentyp | Gley-Auenpararendzina |
| | Humusform | Mull |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | ohne Podsoligkeitsmerkmale |
| | Rutschgefährdung | Keine Rutschgefährdung |
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | Anemone nemorosa-, Convallaria majalis-, Circaea lutetiana-, Rubus caesius-, Urtica dioica - Gruppe |
| | Aufnahmen | 15 Vegetationsaufnahmen (2003 bis 2011) |
| | Natürliche Waldgesellschaft | Artenreicher Buntlaubbaummischwald mit Hainbuche |
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Gemeine Esche, Bergahorn, Hainbuche (Weißbuche) |
| | Nebenbaumart(en) | Feldahorn, Feldulme, Flatterulme, Rotbuche, Spitzahorn, Stieleiche, Traubenkirsche, Vogelkirsche |
| | Pionierbaumart(en) | |

| | | Konkurrenzkraft | Pfleglichkeit | Sicherheit | Leistung | |
|-------------------------|---|---|---------------|------------|----------|---|
| Baumarteneignung | geeignet bis möglich (g/m) | Es | 1 | 2 | 2 | |
| | | BAh | 1 | 2 | 2 | |
| | | HBu | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | möglich (m) | SAh | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | möglich bis wenig geeignet (m/w) | StEi | 3 | 2 | 1 | 2 |
| | wenig geeignet (w) | VKir | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | | FIUI | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | | RBu | 2 | 2 | 3 | 2 |
| | sonstige Laubbaumarten | FAh, FeUI, TrKir | | | | |
| | sonstige Nadelbaumarten | - | | | | |
| Vorkommen | Fläche der Standortseinheit | 18,2 ha | | | | |
| | Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende | gelegentlich/zerstreut (0,3 %) | | | | |
| | Kartierzeitraum | 2010-19 | - | 40,1 % | | |
| | | 2000-09 | - | 59,9 % | | |
| Organisatorisch | Link zur Regionallegende | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_03alpha_planar.pdf | | | | |
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_03alpha_planar.pdf | | | | |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_03alpha_planar.pdf | | | | |
| | Zugehörige Kartierobjekte | 9927, 10057, 10022, 9921, 10032 | | | | |

Impressum

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

 IDaMa GmbH, www.idama.de