

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/06 Rheinhügelland zwischen Baden-Baden und Emmendingen

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

288 (125 bis 435) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,8 (9,4-10,3) Ø Temp. / Jahr [°C]

16,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1010 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

493 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

BML-

Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenem Buntsandstein-Mischlehm



orange
orange Punkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken

in der


Öko-Serie der Buntsandstein-Mischlehme

(Zweischichtböden mit 30 bis 60 cm mächtigen, schwach steinigen, feinsandig-schluffigen Lehmdecken über mäßig durchlässiger, lehmig-sandig-steiniger, meist gesteinsfarbener Buntsandsteinverwitterung, daneben auch buntsandsteinfarbene Mischböden, steinig-sandige Lehme, aus Lösslehm- und Buntsandsteinverwitterung, im Oberboden stärker lehmig, im Unterboden stärker steinig; im Unterboden auch dunkelrotbraune Röttone möglich)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen breite Rücken sowie sonnseitige Verebnungen und flache Hanglagen; Lehmdecke meist nur 20 bis 40 cm
	Bodentyp	Braunerde bis Parabraunerde
	Humusform	Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Deschampsia flexuosa-, Milium effusum-, Pteridium aquilinum - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Traubeneiche
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	Dgl	1	2	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	1	1	2	2
		TrEi	3	2	1	1
		Kie	2	3	1	1
	wenig geeignet (w)	Ta	2	1	2	3
		Fi	2	3	2	2
	ungeeignet (u)	Es	3	1	3	3
		BAh	2	1	3	3
	sonstige Laubbaumarten	EKa, REi, SaBi, WLi				
	sonstige Nadelbaumarten	-				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	44 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (1,15 %)				
	Kartierzeitraum	1970-79 - 100 %				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_06_kollin.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_06_kollin.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_06_kollin.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	7307				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de