

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Oberrheinisches Tiefland

**Regionale Einheit**

1/06 Rheinhügelland zwischen Baden-Baden und Emmendingen

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)


288 (125 bis 435) m. ü. NN

Klima 1961-1990 (regionalisiert)

9,9 Ø Temp. / Jahr [°C]  
16,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]  
1010 Ø Niederschlag / Jahr [mm]  
493 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**LÖA**



d'grün  
blaue Dreiecke ausgefüllt

**Eschen-Bergahorn-Hainbuchen-Wald in Lössauen**

**Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe** Frisch bis feucht, örtlich auch kurzfristig überflutet

in der  
**Gruppe der Lössauen**

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Bachauen mit zeitweilig hochreichendem Grundwasser
	<b>Bodentyp</b>	Auen-Pararendzina bis Auengley
	<b>Humusform</b>	Mull bis Feuchtmull
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, Impatiens noli-tangere-, Urtica dioica-, (Mercurialis perennis-, Lamium galeobdolon) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	keine Vegetationsaufnahmen
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Gemeine Esche, Bergahorn, Hainbuche (Weißbuche)
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	1
		BAh	1	2	2	1
	möglich (m)	StEi	2	2	1	2
	weniger geeignet (w)	TrEi	3	2	2	2
		Ta	2	2	2	3
	weniger- bis ungeeignet (w/u)	RBu	2	2	3	3
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	2
		Kie	3	3	2	3
		Fi	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	HBu, SEr, SPa, SWei, TrKir				
sonstige Nadelbaumarten	-					


  

Vorkommen	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	66,6 ha
	<b>Anteil innerhalb der Regionallegende</b>	häufig (1,74 %)
	<b>Kartierzeitraum</b>	1970-79 - 100 %

Organisatorisch	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/Leg_1_06_kollin.pdf">http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/Leg_1_06_kollin.pdf</a>
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/BaEig_1_06_kollin.pdf">http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/BaEig_1_06_kollin.pdf</a>
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/VegGru_1_06_kollin.pdf">http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/VegGru_1_06_kollin.pdf</a>
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	7307, 7406, 7513

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesbetrieb ForstBW

## Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, [www.idama.de](http://www.idama.de)  
 Freiburg