

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Oberrheinisches Tiefland

**Regionale Einheit**

1/06 Rheinhügelland zwischen Baden-Baden und Emmendingen

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

288 (125 bis 435) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

9,8 (9,4-10,3) Ø Temp. / Jahr [°C]

16,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1010 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

493 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**NM**

**Schwarzerlenwald auf Niedermoor**



blaßblau

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

**Grundfrisch bis feucht**


in der

**Gruppe der vermoorten organischen Nassböden**

(Mehr als 20, bei Moor-Einheiten mehr als 60 cm organische Auflagen, i.d.R. Niedermoortorfbildungen, nicht oder mehr oder weniger zersetzt und vererdet, über nässegeprägtem Mineralboden)

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Senken; Torfauflage teilweise in Zersetzung
	<b>Bodentyp</b>	Niedermoor bis Moorgley
	<b>Humusform</b>	Niedermoortorf
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Filipendula ulmaria-, Urtica dioica-, (Stachys sylvatica) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	keine Vegetationsaufnahmen
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Schwarzerle (Roterle)
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung
<b>Baumarteneignung</b>	wenig geeignet (w)	Es	2	2	3
		StEi	2	2	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Kie	2	2	3
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3
		BAh	3	2	3
		RBu	3	2	3
		Ta	3	2	3
		Fi	3	2	3
	sonstige Laubbaumarten	MoBi, SEr			
	sonstige Nadelbaumarten	-			
<b>Vorkommen</b>	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	2 ha			
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	selten (0,05 %)			
	<b>Kartierzeitraum</b>	1980-89 - 100 %			
<b>Organisatorisch</b>	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_06_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_06_kollin.pdf</a>			
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_06_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_06_kollin.pdf</a>			
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_06_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_06_kollin.pdf</a>			
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	8207			

**Impressum**


Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

**Technische Realisierung:**

 IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)