

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/06 Rheinhügelland zwischen Baden-Baden und Emmendingen

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

288 (125 bis 435) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,8 (9,4-10,3) Ø Temp. / Jahr [°C]

16,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1010 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

493 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

Ri+

Eschen-Bergahorn-Wald in frischen Rinnen und Senken



d'grün

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Frisch bis feucht und grundfeucht

in der

Gruppe der Rinnen und Mulden

(Mehr als 20/30 m breite Rinnen, Bachtäler, breite Mulden und Talsenken, meist mit kolluvialem, stark humosem Lehm)

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Rinnen bis breite Mulden |
| | Bodentyp | Braunerde bis Braunerde-Gley |
| | Humusform | Mull |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | ohne Podsoligkeitsmerkmale |
| | Rutschgefährdung | Keine Rutschgefährdung |
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | Stachys sylvatica-, Ajuga reptans-, Impatiens noli-tangere-, Lamium galeobdolon-, Urtica dioica - Gruppe |
| | Aufnahmen | keine Vegetationsaufnahmen |
| | Natürliche Waldgesellschaft | |
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Gemeine Esche, Bergahorn |
| | Nebenbaumart(en) | |
| | Pionierbaumart(en) | |

| Baumarteneignung | | Konkurrenzkraft | Pfleglichkeit | Sicherheit | Leistung | |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|---|
| | geeignet (g) | Es | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | | BAh | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | | Ta | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | geeignet bis möglich (g/m) | RBu | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | | StEi | 3 | 2 | 1 | 1 |
| | möglich bis wenig geeignet (m/w) | Dgl | 2 | 2 | 3 | 1 |
| | | TrEi | 3 | 2 | 1 | 2 |
| | | Fi | 2 | 2 | 3 | 1 |
| | ungeeignet (u) | Kie | 3 | 3 | 1 | 3 |
| | sonstige Laubbaumarten | BUI, SEr, SWei | | | | |
| sonstige Nadelbaumarten | - | | | | | |

| Vorkommen | Fläche der Standortseinheit | 98,7 ha | | | |
|-----------|---|-----------------|---|--------|--|
| | Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende | häufig (2,59 %) | | | |
| | Kartierzeitraum | 1980-89 | - | 84,8 % | |
| | | 1970-79 | - | 15,2 % | |

| Organisatorisch | Link zur Regionallegende | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_06_kollin.pdf |
|-----------------|---|---|
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_06_kollin.pdf |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_06_kollin.pdf |
| | Zugehörige Kartierobjekte | 8511 (Ri), 8403 (Ri), 7406 (Ri), 8011 (Ri), 7307 (Ri), 8004 (Ri), 7513 (Ri), 7510 (Ri), 8207 (Ri) |

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de