

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Oberrheinisches Tiefland

**Regionale Einheit**

1/06 Rheinhügelland zwischen Baden-Baden und Emmendingen

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

288 (125 bis 435) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

9,8 (9,4-10,3) Ø Temp. / Jahr [°C]


16,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1010 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

493 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**sFLH**



h'braun  
d'rote Schräggitter

**Buchenwald auf stark versauertem Feinlehmhang**

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Mäßig trocken bis trocken**

in der

**Öko-Serie der Feinlehmhänge**

(Mindestens 40, meist mehr als 60 cm entkalkte, z.T. feinsandige Schlufflehme über durchlässigem Untergrund, häufig steinig-grusige Kristallinverwitterung (Granit), auch Buntsandstein und Muschelkalk)


<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standortseinheiten der steileren Hänge sonseitige Hänge; verhagert und durch ehemalige starke Streunutzung gestört
	<b>Bodentyp</b>	Parabraunerde
	<b>Humusform</b>	Moder
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, Pteridium aquilinum - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	keine Vegetationsaufnahmen
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Rotbuche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	RBu	1	1	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	1	2	2	2
	möglich (m)	TrEi	3	2	1	2
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	Ta	2	1	1	3
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	BAh	2	2	2	2
		Kie	2	3	1	2
	wenig geeignet (w)	Fi	2	3	2	2
	ungeeignet (u)	Es	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	EKa, SaBi, Vobe, WLi				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	<b>Fläche der Standortseinheit</b> 4,4 ha
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b> gelegentlich/zerstreut (0,12 %)
	<b>Kartierzeitraum</b> 1970-79 - 100 %

Organisatorisch	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_06_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_06_kollin.pdf</a>
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_06_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_06_kollin.pdf</a>
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_06_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_06_kollin.pdf</a>
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	7307

### Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

### Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

### Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)