

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Oberrheinisches Tiefland

**Regionale Einheit**

1/07 Kaiserstuhl

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

352 (175 bis 556) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

9,5 (9,1-10,4) Ø Temp. / Jahr [°C]

16,0 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

827 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

432 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**EiSt**



h'gelb

**Traubeneichen-Mehlbeeren-Steppenheidewald**

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

**Mäßig trocken bis sehr trocken**


in der

**Gruppe der Rücken, Kuppen und weiteren extremen Lagen**

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten oft sonnseitig exponierte Hangkanten, Sporne, Steilkanten und konvexe Oberhänge; von Löß bis Vulkanitverwitterung wechselhafte Böden; teils kalkig, teils schwach sauer
	<b>Bodentyp</b>	Pararendzina, Mull-Ranker bis gering entwickelte Braunerde
	<b>Humusform</b>	Mull bis Moder
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Tanacetum corymbosum-, Silene nutans-, Mercurialis perennis-, Deschampsia flexuosa-, (Carex flacca-, Milium effusum) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	keine Vegetationsaufnahmen
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Traubeneiche, Mehlbeere
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
<b>Baumarteneignung</b>	möglich und biologisch erwünscht (mb)	TrEi	1	2	1	3
	wenig geeignet (w)	Kie	2	2	2	3
	ungeeignet (u)	Dgl	2	2	3	3
		Es	3	2	3	3
		BAh	3	2	3	3
		RBu	2	2	3	3
		Ta	3	2	3	3
		Fi	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten		FIEi, HBU, MeBe, Rob, SLi			
	sonstige Nadelbaumarten		SKie			
<b>Vorkommen</b>	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	10,3 ha				
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	häufig (0,52 %)				
	<b>Kartierzeitraum</b>	1970-79 - 100 %				
<b>Organisatorisch</b>	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_07_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_07_kollin.pdf</a>				
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_07_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_07_kollin.pdf</a>				
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_07_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_07_kollin.pdf</a>				
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	7508				

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

## Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)