

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Oberrheinisches Tiefland

**Regionale Einheit**

1/07 Kaiserstuhl

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

352 (175 bis 556) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

9,5 (9,1-10,4) Ø Temp. / Jahr [°C]


16,0 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

827 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

432 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**LÖRü-**



d'gelb  
schwarze Dreiecke leer

**Buchen-Traubeneichen-Wald auf Lößrücken**

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Mäßig trocken bis trocken**

in der

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Rücken und Hangrücken, oft Kammlagen; flach- bis mittelgründig; im Untergrund meist Rohlöss, seltener Vulkanitgestein
	<b>Bodentyp</b>	Pararendzina
	<b>Humusform</b>	Mull
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Tanacetum corymbosum-, Silene nutans-, Mercurialis perennis-, Milium effusum - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	keine Vegetationsaufnahmen
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Rotbuche, Traubeneiche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	möglich (m)	TrEi	2	2	1	2
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	RBu	1	2	2	3
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Kie	2	2	2	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Dgl	2	2	3	3
	ungeeignet (u)	Es	2	2	3	3
		BAh	2	2	3	3
		Ta	2	2	3	3
		Fi	2	2	3	3
	<b>sonstige Laubbaumarten</b>	Elsbe, FAh, FeUl, HBu, MeBe, Rob, SAh, SLi				
<b>sonstige Nadelbaumarten</b>	SKie					


  

Vorkommen	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	59,6 ha
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	besonders häufig (3,02 %)
	<b>Kartierzeitraum</b>	1970-79 - 100 %

Organisatorisch	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_07_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_07_kollin.pdf</a>
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_07_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_07_kollin.pdf</a>
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_07_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_07_kollin.pdf</a>
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	7508 (Lörü)

**Impressum**



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

**Technische Realisierung:**

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)