

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Oberrheinisches Tiefland

**Regionale Einheit**

1/07 Kaiserstuhl

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

352 (175 bis 556) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

9,5 (9,1-10,4) Ø Temp. / Jahr [°C]

16,0 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


827 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

432 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**tVML-**

**Hainbuchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenem tonigem Vulkanit-Mischboden**



oliv  
d'braune Punkte

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Mäßig trocken (bis mäßig grundfrisch)**

in der

**Öko-Serie der tonigen Vulkanit-Mischböden**

(Mittel- bis tiefgründiger, meist kalkhaltiger, steiniger bis stark steiniger, toniger (durchmischter) Lehm bis lehmiger Ton oder bis mergeliger Ton aus Gemenge von Oligozän-Mergeln und Vulkanitgesteinen)


<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen; meist mittelgründig
	<b>Bodentyp</b>	Pararendzina und Braunerde
	<b>Humusform</b>	Mull bis Mullmoder
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Milium effusum-, Silene nutans-, Mercurialis perennis-, Carex flacca-, (Lamium galeobdolon) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	keine Vegetationsaufnahmen
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Hainbuche (Weißbuche), Traubeneiche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Kie	2	2	1	1
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	TrEi	2	2	1	2
	wenig geeignet (w)	Es	2	2	2	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Dgl	2	2	3	3
		RBu	2	2	3	3
		Ta	2	2	3	3
	ungeeignet (u)	BAh	2	2	2	3
		Fi	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	Elsbe, HBu, Rob, SAh, SLi, VKir				
sonstige Nadelbaumarten	SKie					

Vorkommen	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	6,7 ha
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	gelegentlich/zerstreut (0,34 %)
	<b>Kartierzeitraum</b>	1970-79 - 100 %

Organisatorisch	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_07_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_07_kollin.pdf</a>
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_07_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_07_kollin.pdf</a>
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_07_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_07_kollin.pdf</a>
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	7508

**Impressum**



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

**Technische Realisierung:**

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)