

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/08 Markgräflerland mit Schönberg und Tuniberg

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

393 (194 bis 643) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,6 (9,1-10,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

16,2 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

929 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

453 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

KSH-

Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenem Kalkschutthang



blaßd'braun
d'braune Schräggitter

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken bis trocken

in der

Öko-Serie der Kalkschutthänge

(Unterschiedlich steinige und kalkhaltige, lehmige bis lehmig-tonige Lösungsreste der Kalksteinverwitterung, Hangfließerden und von steinigem Hangschutt des Muschelkalks, des Hauptrogensteins (Braunjurakalk) und Tertiärkonglomerats (Oligozänkalk); teils mit einer bis etwa 35 cm mächtigen Schlufflehmauflage)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der steileren Hänge sonnseitige Hänge
	Bodentyp	Rendzina, auch Rendzina-Terra fusca
	Humusform	Mull bis Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Mercurialis perennis-, Milium effusum-, Lamium galeobdolon-, Stachys sylvatica-, Silene nutans - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Seggen-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Traubeneiche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Elsbeere, Feldahorn, Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche), Spitzahorn, Vogelkirsche, Winterlinde
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Mehlbeere, Sandbirke (Hängebirke), Stieleiche, Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	RBu	1	2	1	2
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	TrEi	3	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Kie	2	2	2	2
	wenig geeignet (w)	Es	2	2	2	3
		BAh	2	2	2	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Ta	3	2	2	3
	ungeeignet (u)	Dgl	2	2	3	3
		Fi	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	SAh				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	250,6 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	besonders häufig (7,45 %)
	Kartierzeitraum	1990-99 - 4,7 %
		1980-89 - 0,1 %
		1970-79 - 95,2 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_08_kollin.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_08_kollin.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_08_kollin.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	7510, 7512 (mtrKSH), 7714 (mtrKSH), 9910, 7405 (mtrKSH), 8802 (mtrKSH)

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de