

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/08 Markgräflerland mit Schönberg und Tuniberg

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

393 (194 bis 643) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,6 (9,1-10,2) Ø Temp. / Jahr [°C]


16,2 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

929 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

453 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

KSH



blaßd'braun
h'grüne Schräggitter

Buchenwald auf mäßig frischem Kalkschutthang

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch

in der


Öko-Serie der Kalkschutthänge

(Unterschiedlich steinige und kalkhaltige, lehmige bis lehmig-tonige Lösungsreste der Kalksteinverwitterung, Hangfließerden und von steinigem Hangschutt des Muschelkalks, des Haupttrogensteins (Braunjurakalk) und Tertiärkonglomerats (Oligozänkalk); teils mit einer bis etwa 35 cm mächtigen Schlufflehmauflage)

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Standortseinheiten der steileren Hänge meist schattseitige Hanglagen, sonnseitige Hangmulden und Unterhänge |
| | Bodentyp | Rendzina-Terra fusca bis Terra fusca |
| | Humusform | Mull |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | ohne Podsoligkeitsmerkmale |
| | Rutschgefährdung | Keine Rutschgefährdung |
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | Mercurialis perennis-, Stachys sylvatica-, Lamium galeobdolon-, Ajuga reptans-, Miliium effusum-, (Silene nutans) - Gruppe |
| | Aufnahmen | keine Vegetationsaufnahmen |
| | Natürliche Waldgesellschaft | Waldgersten-Buchenwald |
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Rotbuche |
| | Nebenbaumart(en) | Bergahorn, Elsbeere, Feldahorn, Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche), Spitzahorn, Traubeneiche, Vogelkirsche |
| | Pionierbaumart(en) | Mehlbeere |

| | | Konkurrenzkraft | Pfleglichkeit | Sicherheit | Leistung | |
|-------------------------|---|---|---------------|------------|----------|---|
| Baumarteneignung | geeignet (g) | RBu | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | geeignet bis möglich (g/m) | TrEi | 3 | 2 | 1 | 1 |
| | möglich (m) | Es | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | BAh | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | möglich bis wenig geeignet (m/w) | Dgl | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Kie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Fi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | wenig geeignet (w) | Ta | 3 | 2 | 1 | 3 |
| | sonstige Laubbaumarten | SAh, VKir | | | | |
| | sonstige Nadelbaumarten | - | | | | |
| Vorkommen | Fläche der Standortseinheit | 474,2 ha | | | | |
| | Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende | besonders häufig (14,09 %) | | | | |
| | Kartierzeitraum | 1990-99 | - | 2 % | | |
| | | 1980-89 | - | 0,1 % | | |
| | | 1970-79 | - | 97,9 % | | |
| Organisatorisch | Link zur Regionallegende | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_08_kollin.pdf | | | | |
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_08_kollin.pdf | | | | |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_08_kollin.pdf | | | | |
| | Zugehörige Kartierobjekte | 7510, 7512, 7714, 9910, 7405, 8802 | | | | |

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de