

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/08 Markgräflerland mit Schönberg und Tuniberg

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

393 (194 bis 643) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,6 (9,1-10,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

16,2 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

929 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

453 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

KVL-

Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenem Kalkverwitterungslehm



blaßd'braun
d'braune Senkrechtstriche

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken, örtlich bis trocken


in der

Öko-Serie der Kalkverwitterungslehme

(Mittel- und flachgründige, steinige, lehmig-tonige Lösungsrückstände der Kalksteinverwitterung über durchlässigem klüftigem Weiß- und Braunjura und Oligozän (Karstdrainage); Schlufflehm-Auflage oder - Beimengung bis 25cm möglich)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen, breite Rücken und sonnseitige Flachhänge; flach- bis mittelgründig und steinig, Entkalkung zwischen 0 und 20 cm
	Bodentyp	Braunerde-Rendzina bis (flache) Terra fusca
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Mercurialis perennis-, Miliun effusum-, Silene nutans-, Lamium galeobdolon - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Traubeneiche
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	1	2	1	2
		TrEi	2	2	1	2
		Kie	2	2	1	1
	wenig geeignet (w)	Ta	2	2	2	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Dgl	2	2	3	3
		BAh	2	2	3	3
	ungeeignet (u)	Fi	2	2	3	3
	biologisch erwünscht (b)	Es	2	2	1	3
	sonstige Laubbaumarten	FAh, Rob, SAh, SLi				
	sonstige Nadelbaumarten	SKie				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	88,5 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (2,63 %)				
	Kartierzeitraum	1970-79 - 100 %				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_08_kollin.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_08_kollin.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_08_kollin.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	7510, 7512 (mtrKVL), 7714 (mtrKVL), 7405 (mtrKVL)				

Impressum


Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

 IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de