

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/08 Markgräflerland mit Schönberg und Tuniberg

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

393 (194 bis 643) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,6 (9,1-10,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

16,2 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


929 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

453 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

Me-

Traubeneichen-Elsbeeren-Hainbuchen-Wald auf mäßig trockenem Mergelboden



oliv
d'gelbe Punkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken bis wechsell trocken

in der


Öko-Serie der Mergelböden und Mergeltone

(Kleinsteinig-bröckelig, schluffig und schluffig-tonig verwitternde Mergel des Oberen Braunjuras und des Tertiärs, in der Regel freier Kalk bis oder bis nahe zur Oberfläche; z.T. bis 40 cm Tiefe plastiziert und entkalkt; dünne Schlufflehmauflage bis 15/20 cm möglich)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen
	Bodentyp	Mergelrendzina bis Pelosol-Rendzina
	Humusform	Mull bis Kalkmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Mercurialis perennis-, Carex flacca-, Milium effusum-, Molinia caerulea-, (Deschampsia flexuosa-, Silene nutans) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Traubeneiche, Elsbeere, Hainbuche (Weißbuche)
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet bis möglich (g/m)	TrEi	3	2	1	1
	möglich (m)	Kie	2	2	1	2
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	RBu	1	2	2	3
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Es	2	2	1	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	BAh	3	2	2	3
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	3
		Ta	2	2	3	3
		Fi	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	Elsbe, FAh, HBu, Rob, SLi				
	sonstige Nadelbaumarten	-				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	7,6 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,23 %)				
	Kartierzeitraum	1970-79 - 100 %				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_08_kollin.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_08_kollin.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_08_kollin.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	7512 (mtrM), 7714 (mtrM), 7405 (mtrM)				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de