

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Oberrheinisches Tiefland

**Regionale Einheit**

1/09 Dinkelberg

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

413 (254 bis 533) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

9,1 (8,6-9,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

15,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1077 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

485 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**DSH-**

**Buchenwald auf mäßig trockenem  
Dolomitschutthang**



blaßd'braun  
d'braune Schräggitter

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Mäßig trocken bis trocken**

in der

**Öko-Serie der Dolomit- und Kalkschutthänge**

(Steiniger, Rendzina-artiger Hangschutt bis mittelgründig verlehmt, lehmig-tonige Lösungsrückstände in Hangfließerden der Dolomit -und Kalksteinverwitterung des Muschelkalks, meist oberflächennaher Kalkspiegel, insbesondere Dolomitverwitterungslehm noch unregelmäßig karbonathaltig, Entkalkung bis 40 cm möglich)


<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standortseinheiten der steileren Hänge sonnseitige Hänge
	<b>Bodentyp</b>	Rendzina-Terra fusca bis Braunerde-Terra fusca
	<b>Humusform</b>	Mull, selten Mullmoder (unter Nadelholzerstaufforstung)
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Milium effusum-, Lamium galeobdolon-, Mercurialis perennis-, Carex alba-, Silene nutans-, Carex flacca-, Tanacetum corymbosum-, (Rubus-, Ajuga reptans-, Urtica dioica) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	10 Vegetationsaufnahmen (2016 bis 2017)
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Waldgersten-Buchenwald; Seggen-Buchenwald
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Rotbuche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Bergahorn, Elsbeere, Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche), Sommerlinde, Spitzahorn, Traubeneiche, Vogelkirsche
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	Feldahorn, Hasel, Mehlbeere

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	möglich (m)	TrEi	2	2	1	3
		StEi	2	2	1	3
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	RBu	1	2	1	3
	wenig geeignet (w)	Es	2	2	2	3
		BAh	2	2	2	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Dgl	3	2	3	2
	ungeeignet (u)	Kie	3	2	3	2
		Ta	3	2	3	3
		Fi	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	BUI, Elsbe, FAh, HBu, MeBe, SAh, SLi, VKir, WLi				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	94,6 ha
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	häufig (2,3 %)
	<b>Kartierzeitraum</b>	2010-19 - 4 %
		2000-09 - 0,3 %
		1970-79 - 95,7 %

Organisatorisch	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_09_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_09_kollin.pdf</a>
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_09_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_09_kollin.pdf</a>
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_09_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_09_kollin.pdf</a>
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	7405 (mtrDSH), 7310 (mtrDSH), 7311 (mtrDSH), 10088, 10081, 9968

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

## Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)