

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Oberrheinisches Tiefland

**Regionale Einheit**

1/09 Dinkelberg

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

413 (254 bis 533) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

9,1 (8,6-9,8) Ø Temp. / Jahr [°C]


15,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1077 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

485 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**LH+**



h'braun  
d'grüne Schräggitter

**Buchenwald auf frischem Lehmhang**

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Frisch, auch bis mäßig frisch**


in der

**Öko-Serie der Lehmhänge**

(Mehr als 40 cm Schlufflehm, meist Lösslehm, über Muschelkalk-, seltener über Buntsandstein- oder Keuperverwitterung)

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standortseinheiten der steileren Hänge meist schattseitige Hänge, stellenweise schwach kiesig
	<b>Bodentyp</b>	Parabraunerde und Braunerde
	<b>Humusform</b>	Mull, selten Mullmoder
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Ajuga reptans-, Milium effusum-, Lamium galeobdolon-, Rubus-, Urtica dioica-, Corydalis-, (Mercurialis perennis-, Stachys sylvatica) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	17 Vegetationsaufnahmen (2016 bis 2017)
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Waldmeister-Buchenwald
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Rotbuche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Bergahorn, Bergulme, Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche), Spitzahorn, Traubeneiche
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	Aspe (Zitterpappel), Feldahorn, Hasel, Salweide, Vogelkirsche

	Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung		
<b>Baumarteneignung</b>	<b>geeignet (g)</b>	Es	1	2	1	1
		BAh	1	2	1	1
		RBu	1	2	1	1
	<b>geeignet bis möglich (g/m)</b>	TrEi	2	2	1	1
		Ta	2	2	1	1
		Fi	2	2	2	1
	<b>möglich (m)</b>	Dgl	2	2	2	1
		StEi	3	2	1	1
	<b>wenig- bis ungeeignet (w/u)</b>	Kie	3	2	2	3
	<b>sonstige Laubbaumarten</b>	Aspe, BUI, HBU, SAh, SWei, VKir, WLi				
	<b>sonstige Nadelbaumarten</b>	ELä				
<b>Vorkommen</b>	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	117,2 ha				
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	häufig (2,85 %)				
	<b>Kartierzeitraum</b>	2010-19	-	13,9 %		
		1970-79	-	86,1 %		
<b>Organisatorisch</b>	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_09_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_09_kollin.pdf</a>				
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_09_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_09_kollin.pdf</a>				
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_09_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_09_kollin.pdf</a>				
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	7310 (frLH), 7405 (frLH), 10088, 10081, 7311 (frLH)				

**Impressum**

**Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg**  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

**Technische Realisierung:**

 IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)