

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/09 Dinkelberg

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

413 (254 bis 533) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,1 (8,6-9,8) Ø Temp. / Jahr [°C]


15,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1077 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

485 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

ML



orange
h'grüne Punkte

Buchenwald auf mäßig frischem Mischlehm

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch (stellenweise bis frisch)

in der


Öko-Serie der nicht oder wenig vernässenden Buntsandstein-Mischlehme

(25 bis 60 cm sandiger SchluffeHM, z.T. schwach steinig, über mehr oder weniger durchlässiger Sandsteinverwitterung und sandig-toniger Fließerde des Buntsandsteins, auch des Rotliegenden; neben der zweischichtigen Form auch stärker durchmischte Ausbildungen mit undeutlicher Schichtgrenze)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen
	Bodentyp	(z.T. zweischichtige) Braunerde bis Parabraunerde
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Ajuga reptans-, Rubus-, Carex brizoides-, Luzula luzuloides-, Lamium galeobdolon-, (Urtica dioica-, Deschampsia flexuosa) - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (2017)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldmeister-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche), Traubeneiche, Vogelkirsche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche)

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	RBu	1	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	2	2	1	1
		TrEi	2	2	1	1
		Fi	2	2	2	1
	möglich (m)	StEi	3	2	1	1
		Ta	2	2	2	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Es	2	2	2	2
		BAh	2	2	2	2
		Kie	3	2	1	2
	sonstige Laubbaumarten		Aspe, HBU, SaBi, SWei, VKir, Vobe, WLi			
sonstige Nadelbaumarten		ELä				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	13,9 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,34 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	11,7 %		
		1970-79	-	88,3 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_09_kollin.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_09_kollin.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_09_kollin.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	7310, 7311, 10088				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de