

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/09 Dinkelberg

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

413 (254 bis 533) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,1 (8,6-9,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

15,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1077 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

485 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

MeTH

Buchen-Eschen-Wald auf mäßig frischem Mergeltonhang



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch, stellenweise bis mäßig trocken und frisch bis hangfrisch

oliv
h'grüne Schräggitter
h'grüne Senkrechtstrichelung

in der


Öko-Serie der Mergeltonhänge

(Wenig entwickelte und bis etwa 40 cm tief plastizierte, schluffig-tonige Böden mit und über bröckligen bis sandig-schluffigen Mergeln des Unteren Muschelkalks, Karbonat Spiegel an oder nahe der Oberfläche, max. in 40 cm Tiefe)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der steileren Hänge Hänge unterschiedlicher Exposition; örtlich Rutsch tendenz
	Bodentyp	Rendzina-Pelosol, auch Kalkmergel-Pelosol
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	keine Eingabe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Milium effusum-, Lamium galeobdolon-, Corydalis-, (Impatiens noli-tangere-, Carex flacca-, Mercurialis perennis) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Traubeneiche, Bergahorn, Hainbuche (Weißbuche), Bergulme, Sommerlinde, Spitzahorn, Vogelkirsche, Elsbeere
	Pionierbaumart(en)	Salweide, Aspe (Zitterpappel), Feldahorn

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	Es	1	2	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	1	2	1	2
	möglich (m)	BAh	2	2	1	2
		TrEi	2	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	2	2
		StEi	3	2	1	2
		Ta	2	2	2	2
	wenig geeignet (w)	Kie	3	2	2	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Fi	3	2	3	2
	sonstige Laubbaumarten	Aspe, BUI, Elsbe, FAh, HBu, SAh, SLi, SWei, VKir				
	sonstige Nadelbaumarten	ELä				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	2,2 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	selten (0,05 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19 - 100 %				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_09_kollin.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_09_kollin.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_09_kollin.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	10088				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de