

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/09 Dinkelberg

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

413 (254 bis 533) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,1 (8,6-9,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

15,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1077 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

485 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

Ri

Buchen-Eschen-Bergahorn-Wald in mäßig frischen Rinnen und Senken



d'grün

d'braune Senkrechtstrichelung

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch

in der


Gruppe der Rinnen und Mulden

(Unterschiedlich breite Rinnen, Mulden, Senken und Hangmulden, bodenartlich wechselnde Kolluvien, meist mit durchlässigem Untergrund)

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Rinnen und Mulden, auch Hangmulden mit kolluvialem Dolomitverwitterungslehm und Dolomitschutt, geringem Schlufflehmanteil, über Muschelkalkuntergrund mit Karstdrainage |
| | Bodentyp | Braunerde-Rendzina bis Terra fusca-Braunerde |
| | Humusform | Mull |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | ohne Podsoligkeitsmerkmale |
| | Rutschgefährdung | Keine Rutschgefährdung |
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | Lamium galeobdolon-, Mercurialis perennis-, Ajuga reptans-, (Milium effusum-, Stachys sylvatica-, Urtica dioica) - Gruppe |
| | Aufnahmen | keine Vegetationsaufnahmen |
| | Natürliche Waldgesellschaft | Ahorn-Eschenwald; Waldgersten-Buchenwald |
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Rotbuche, Gemeine Esche, Bergahorn |
| | Nebenbaumart(en) | Hainbuche (Weißbuche), Traubeneiche |
| | Pionierbaumart(en) | |

| | | Konkurrenzkraft | Pfleglichkeit | Sicherheit | Leistung | |
|-------------------------|---|---|---------------|------------|----------|---|
| Baumarteneignung | geeignet (g) | Es | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | | BAh | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | | RBu | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | möglich (m) | TrEi | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | | StEi | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | | Ta | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | | Fi | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | wenig geeignet (w) | Kie | 2 | 3 | 2 | 2 |
| | ungeeignet (u) | Dgl | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | sonstige Laubbaumarten | BUI, HBu, SAh, SWei, WLi | | | | |
| | sonstige Nadelbaumarten | - | | | | |
| Vorkommen | Fläche der Standortseinheit | 7,3 ha | | | | |
| | Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende | gelegentlich/zerstreut (0,18 %) | | | | |
| | Kartierzeitraum | 1970-79 - 100 % | | | | |
| Organisatorisch | Link zur Regionallegende | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_09_kollin.pdf | | | | |
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_09_kollin.pdf | | | | |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_09_kollin.pdf | | | | |
| | Zugehörige Kartierobjekte | 7405, 7310, 10081 | | | | |

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de