

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/09 Dinkelberg

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

413 (254 bis 533) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,1 (8,6-9,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

15,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1077 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

485 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

SL

Buchenwald auf mäßig frischem Schichtlehm



h'braun
d'braune Punkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch (bis frisch)

in der


Öko-Serie der Schichtlehme

(25 bis 60 cm schluffiger Lehm, meist Lösslehm, über Dolomit- und Kalkverwitterungslehm und/oder aufgelockerten Muschelkalkschichten mit Karstdrainage)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen zum Teil auch sonnseitig geneigte Flachlagen
	Bodentyp	Parabraunerde und Braunerde (über Terra fusca)
	Humusform	Mull, unter Fi bis Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Lamium galeobdolon-, Ajuga reptans-, Rubus-, Urtica dioica-, (Mercurialis perennis-, Corydalis-, Carex alba) - Gruppe
	Aufnahmen	9 Vegetationsaufnahmen (2016 bis 2017)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldmeister-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche), Spitzahorn, Traubeneiche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Feldahorn, Hasel, Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Vogelkirsche

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	RBu	1	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	2	2	1	1
		TrEi	2	2	1	1
	möglich (m)	Es	2	2	1	2
		BAh	2	2	1	2
		StEi	3	2	1	1
		Fi	2	2	2	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Kie	3	2	1	2
		Ta	2	2	2	2
	sonstige Laubbaumarten	Aspe, BUI, FAh, HBU, SAh, SWei, VKir, WLi				
sonstige Nadelbaumarten	ELä					
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	296,6 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	besonders häufig (7,2 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	2,5 %		
		1970-79	-	97,5 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_09_kollin.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_09_kollin.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_09_kollin.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	7310, 7405, 7311, 10081, 10088				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de