

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Oberrheinisches Tiefland

**Regionale Einheit**

1/09 Dinkelberg

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

413 (254 bis 533) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

9,1 (8,6-9,8) Ø Temp. / Jahr [°C]


15,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1077 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

485 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**SchoLH**



h'braun

h'grüne Schräggitter

schwarze Kringel (systematisch verteilt)

**Buchenwald auf mäßig frischem Schotterlehmbang**

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Mäßig frisch bis frisch**

in der

**Öko-Serie der Schotterlehmbänge**

(Mehr als 40 cm kiesiger diluvialer Schlufflehm und Grobschotterschicht über Muschelkalkverwitterung)


<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standortseinheiten der steileren Hänge meist schattseitige Hänge, auch sonnseitige Unterhanglagen mit kalkreichen Stellen
	<b>Bodentyp</b>	Braunerde
	<b>Humusform</b>	Mull bis Mullmoder, (örtlich Moder)
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Deschampsia flexuosa-, Ajuga reptans-, Lamium galeobdolon-, Milium effusum-, (Carex brizoides-, Mercurialis perennis) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	keine Vegetationsaufnahmen
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Rotbuche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	RBu	1	2	1	1
		TrEi	2	2	1	1
		StEi	2	2	1	1
	möglich (m)	Dgl	2	2	2	2
		Fi	2	2	2	1
	wenig geeignet (w)	BAh	3	2	2	2
		Ta	3	2	2	2
	ungeeignet (u)	Es	3	2	2	3
		Kie	3	3	2	3
sonstige Laubbaumarten		BUI, HBu, SAh, VKir, WLi				
sonstige Nadelbaumarten		ELä				

Vorkommen	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	29,3 ha
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	häufig (0,71 %)
	<b>Kartierzeitraum</b>	2000-09 - 2,1 %
		1970-79 - 97,9 %

Organisatorisch	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_09_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_09_kollin.pdf</a>
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_09_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_09_kollin.pdf</a>
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_09_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_09_kollin.pdf</a>
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	7310, 9968

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

## Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)