

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/09 Dinkelberg

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

413 (254 bis 533) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,1 (8,6-9,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

15,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1077 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

485 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

TH+



oliv
d'grüne Schräggitter

Buchen-Eschen-Wald auf frischem Tonhang

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

**Frisch, stellenweise hangfrisch und
mäßig frisch**

in der

Öko-Serie der Tonhänge

(Plastizierter, mehr oder weniger zäher Ton und schluffiger Ton aus Tonstein- und Mergelverwitterung des Unteren Muschelkalks, des Keupers und (selten) des Lias; lockerer, tonig-lehmiger Oberboden möglich; Karbonatspiegel in der Regel in bzw. unterhalb 40 cm Tiefe)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der steileren Hänge schattseitige Hänge
	Bodentyp	Braunerde-Pelosol und Pelosol
	Humusform	Mull (selten Mullmoder bis Moder)
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Corydalis-, Impatiens noli-tangere-, Rubus-, Lamium galeobdolon-, Miliun effusum-, (Carex brizoides-, Deschampsia flexuosa-, Urtica dioica) - Gruppe
	Aufnahmen	3 Vegetationsaufnahmen (2017)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldmeister-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Traubeneiche, Bergahorn, Bergulme, Hainbuche (Weißbuche), Spitzahorn, Vogelkirsche, Sommerlinde
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Salweide

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	1
		RBu	1	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	BAh	1	2	1	2
	möglich (m)	TrEi	2	2	1	2
		StEi	3	2	1	2
		Ta	2	2	1	2
	wenig geeignet (w)	Dgl	3	2	2	2
		Kie	3	2	2	2
		Fi	3	2	2	2
sonstige Laubbaumarten		Aspe, BUI, HBU, SAh, SLi, SWei, VKir, WLi				
sonstige Nadelbaumarten		-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	44,4 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (1,08 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 3 %
		1970-79 - 97 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_09_kollin.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_09_kollin.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_09_kollin.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	7310 (frTH), 7405 (frTH), 10088

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de