

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/09 Dinkelberg

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

413 (254 bis 533) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,1 (8,6-9,8) Ø Temp. / Jahr [°C]


15,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1077 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

485 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

TH



oliv
h'grüne Schräggitter

Buchenwald auf mäßig frischem Tonhang

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch, z.T. bis frisch

in der

Öko-Serie der Tonhänge

(Plastizierter, mehr oder weniger zäher Ton und schluffiger Ton aus Tonstein- und Mergelverwitterung des Unteren Muschelkalks, des Keupers und (selten) des Lias; lockerer, tonig-lehmiger Oberboden möglich; Karbonatspiegel in der Regel in bzw. unterhalb 40 cm Tiefe)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der steileren Hänge meist schattseitige Hänge und sonnseitige Hangmulden
	Bodentyp	Pelosol und Braunerde-Pelosol
	Humusform	Mull, selten Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Milium effusum-, Corydalis-, Lamium galeobdolon-, Rubus-, (Carex alba-, Carex flacca-, Impatiens noli-tangere) - Gruppe
	Aufnahmen	6 Vegetationsaufnahmen (2016 bis 2017)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldmeister-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Elsbeere, Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche), Sommerlinde, Spitzahorn, Traubeneiche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Feldahorn, Hasel, Salweide, Sandbirke (Hängebirke)

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet bis möglich (g/m)	Es	2	2	1	2
		RBu	1	2	1	2
	möglich (m)	BAh	2	2	2	2
		TrEi	2	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	2	2
		StEi	3	2	1	2
		Kie	3	2	1	2
		Fi	2	2	2	2
	wenig geeignet (w)	Ta	3	2	2	2
	sonstige Laubbaumarten	Aspe, BUI, Elsbe, FAh, HBU, SAh, SLi, SWei, VKir				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	112,7 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (2,74 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 7,5 %
		2000-09 - 10,5 %
		1970-79 - 82 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_09_kollin.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_09_kollin.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_09_kollin.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	7310, 7405, 9968, 10088, 7311, 10081

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de