

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/09 Dinkelberg

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

413 (254 bis 533) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,1 (8,6-9,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

15,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1077 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

485 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

TLH+

**Buchen-Bergahorn-Eschen-Wald auf frischem
Tonlehmhang**



h'grün
d'grüne Schräggitter

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch (bis grundfrisch)

in der

Öko-Serie der Tonlehmhänge

(Zwischen 25 und 60 cm schluffiger Lehm, meist vermischte Lösslehmfließerde, mit allmählichem, teilweise stauwassergezeichnetem Übergang zu etwas pseudovergleytem, tonigem Unterboden und Untergrund aus Tonsteinen und Mergeln des Keupers und des Unteren Muschelkalks)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der steileren Hänge schattseitige Hanglagen
	Bodentyp	Parabraunerde und Braunerde, z. T. schwach pseudovergleyt
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Milium effusum-, Corydalis-, Rubus-, Lamium galeobdolon-, Impatiens noli-tangere-, (Stachys sylvatica-, Urtica dioica-, Mercurialis perennis) - Gruppe
	Aufnahmen	2 Vegetationsaufnahmen (2017)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldmeister-Buchenwald; Waldgersten-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Bergahorn, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Traubeneiche, Hainbuche (Weißbuche), Vogelkirsche, Bergulme, Spitzahorn
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Salweide

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	1
		BAh	1	2	1	1
		RBu	1	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	Ta	2	2	1	1
		Fi	2	2	2	1
	möglich (m)	Dgl	2	2	2	1
		TrEi	2	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	StEi	3	2	1	2
	wenig geeignet (w)	Kie	3	2	1	3
	sonstige Laubbaumarten	Aspe, BUI, HBU, SaBi, SAh, SWei, VKir, Vobe, WLi				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	20,3 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,49 %)			
	Kartierzeitraum	2010-19	-	34,7 %	
		2000-09	-	4,2 %	
		1970-79	-	61,1 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_09_kollin.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_09_kollin.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_09_kollin.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	10088, 7310 (frTLH), 7405 (frTLH), 7311 (frTLH), 9968, 10081

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de