

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/09 Dinkelberg

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

413 (254 bis 533) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,1 (8,6-9,8) Ø Temp. / Jahr [°C]


15,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1077 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

485 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

TLH



h'grün
h'grüne Schräggitter

Buchenwald auf mäßig frischem Tonlehmhang

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch (bis frisch)


in der

Öko-Serie der Tonlehmhänge

(Zwischen 25 und 60 cm schluffiger Lehm, meist vermischte Lösslehmfließerde, mit allmählichem, teilweise stauwassergezeichnetem Übergang zu etwas pseudovergleytem, tonigem Unterboden und Untergrund aus Tonsteinen und Mergeln des Keupers und des Unteren Muschelkalks)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der steileren Hänge schatt- und sonnseitige Hanglagen
	Bodentyp	Parabraunerde, z. T. im Unterboden schwach pseudovergleyt, bis Pelosol-Braunerde
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Ajuga reptans-, Lamium galeobdolon-, Rubus-, Corydalis-, (Mercurialis perennis-, Urtica dioica-, Deschampsia flexuosa) - Gruppe
	Aufnahmen	7 Vegetationsaufnahmen (2016 bis 2017)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldmeister-Buchenwald; Waldgersten-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche), Spitzahorn, Traubeneiche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	RBu	1	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	2	2	1	1
		TrEi	2	2	1	1
	möglich (m)	Es	2	2	1	2
		BAh	2	2	1	2
		StEi	3	2	1	1
		Ta	2	2	1	2
		Fi	2	2	2	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Kie	3	2	1	2
	sonstige Laubbaumarten	Aspe, BUI, HBU, SaBi, SAh, SWei, VKir, Vobe, WLi				
	sonstige Nadelbaumarten	ELä				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	7,7 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,19 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	61,6 %		
		2000-09	-	38,4 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_09_kollin.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_09_kollin.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_09_kollin.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	10088, 9968, 10081				

Impressum

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

 IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de