

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/09 Dinkelberg

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

413 (254 bis 533) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,1 (8,6-9,8) Ø Temp. / Jahr [°C]


15,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1077 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

485 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

TMe



oliv
h'grüne Punkte

Buchenwald auf mäßig frischem Tonmergelboden

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch (auch bis mäßig trocken)

in der


Öko-Serie der Mergelböden und Mergeltone

(Wenig entwickelte und bis etwa 40 cm tief plastizierte, schluffig-tonige Böden mit und über bröckligen Mergeln des Keupers und des Unteren Muschelkalks, Karbonat Spiegel an oder nahe der Oberfläche, max. in 40 cm Tiefe)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen
	Bodentyp	Rendzina-Pelosol, auch Kalkmergel-Pelosol
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Lamium galeobdolon-, Carex flacca-, (Molinia caerulea-, Mercurialis perennis-, Miliun effusum) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald; Seggen-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Elsbeere, Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche), Spitzahorn, Traubeneiche, Vogelkirsche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Feldahorn, Hasel, Salweide

	Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung		
Baumarteneignung	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	1	2	1	2
	möglich (m)	Es	2	2	1	2
		BAh	2	2	1	2
		TrEi	2	2	1	2
		StEi	2	2	1	2
	wenig geeignet (w)	Kie	3	2	2	2
		Ta	3	2	2	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Dgl	3	2	3	2
		Fi	3	2	3	2
	sonstige Laubbaumarten	Aspe, Elsbe, FAh, HBU, SAh, SWei, VKir, WLi				
sonstige Nadelbaumarten	ELä					
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	18,2 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,44 %)				
	Kartierzeitraum	2000-09	-	2,9 %		
		1970-79	-	97,1 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_09_kollin.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_09_kollin.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_09_kollin.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	7405 (TM), 7310 (TM), 7311 (TM), 10081, 9968				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de