

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/09 Dinkelberg

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

413 (254 bis 533) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,1 (8,6-9,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

15,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1077 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

485 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

wftB

Buchen-Eschen-Wald auf wechselfeuchtem tonigem Boden



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Wechselfeuchte (örtlich bis grundfeuchte)

oliv
schwarze Wellenlinien

in der

Öko-Serie der vernässenden tonigen Böden

(Bis zu 25 cm und auch bis max. 60 cm, unterschiedlich stark staunässegezeichneter, tonig-schluffiger Lehm aus vermischtem, umgelagertem Lösslehm über kaum durchlässigem, pseudovergleytem Ton des Keupers)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Mulden und Flachlagen
	Bodentyp	Pseudogley-Pelosol bis Pelosol-Pseudogley, auch (zweischichtige) Pseudogley-Braunerde
	Humusform	Mull bis Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Carex brizoides-, Molinia caerulea-, Deschampsia flexuosa-, Carex flacca-, (Impatiens noli-tangere-, Lamium galeobdolon-, Ajuga reptans-, Milium effusum) - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (2016)
	Natürliche Waldgesellschaft	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald; Waldmeister-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Hainbuche (Weißbuche), Schwarzerle (Roterle), Stieleiche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Hasel, Salweide

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet bis möglich (g/m)	Es	1	2	1	2
		StEi	1	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	BAh	2	2	2	2
		TrEi	2	2	2	2
		Kie	3	2	1	2
		Ta	3	2	1	2
	wenig geeignet (w)	RBu	2	2	3	2
		Fi	2	2	3	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Dgl	3	2	3	2
	sonstige Laubbaumarten	Aspe, BUI, HBU, SEr, SWei				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	18,5 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,45 %)
	Kartierzeitraum	2000-09 - 18,2 %
		1970-79 - 81,8 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_09_kollin.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_09_kollin.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_09_kollin.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	7310 (wfeutB), 9968, 10081, 7311 (wfeutB)

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de