

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Odenwald

Regionale Einheit

2/01 Grundgebirgs-Odenwald

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

274 (105 bis 458) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,3 Ø Temp. / Jahr [°C]

15,9 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


934 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

423 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

FLH-

**Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenem
Feinlehmhang**



Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

**deutliche sommerliche Austrocknung;
mäßig trocken bis mäßig frisch**

h'braun
orange Schräggitter

in der

Öko-Serie der Feinlehmhänge

(Mehr als 60 cm Schlufflehm, z.T. schwach feinsandig bis grusig, über Löss oder durchlässigem Hangschutt des Kristallins, ausnahmsweise des Buntsandsteins; stellenweise stärker grusig-sandig-steinig, auch kleine Fläche mit lehmigem Grus; örtlich grusig-sandig-steiniger Unterboden in 30 bis 50 cm Tiefe)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der steileren Hänge sonnseitige Hänge
	Bodentyp	Parabraunerde, z.T. podsolig
	Humusform	Moder (Mullmoder), örtlich Hagerhumus
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Deschampsia flexuosa-, Milium effusum-, Carex montana-, Asarum europaeum-, Vaccinium myrtillus-, (Molinia) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Traubeneiche
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	1	2	1	2
		TrEi	1	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	2	2
	wenig geeignet (w)	Es	3	2	2	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Kie	3	3	2	2
		Fi	2	3	3	2
	ungeeignet (u)	BAh	2	2	3	3
		Ta	3	2	2	3
	sonstige geeignete Baumart (X)	EKa	-	-	-	-
		REi	-	-	-	-
	sonstige Laubbaumarten	EKa, HBu, REi, SAh, VKir, WLi				
	sonstige Nadelbaumarten	ELä				
	Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	24,2 ha			
Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende		häufig (1,04 %)				
Kartierzeitraum		1980-89 - 100 %				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_01_kollin.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_01_kollin.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_01_kollin.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	8103				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de