

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Odenwald

**Regionale Einheit**

2/01 Grundgebirgs-Odenwald

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

274 (105 bis 458) m. ü. NN

Klimadaten 1961-  
1990 (regionalisiert)\*

9,3 Ø Temp. / Jahr [°C]


15,9 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

934 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

423 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**SchL**



h'braun  
schwarze Senkrechtstrichelung

**Buchenwald auf mäßig frischem Schieferlehm**

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Mäßig frisch**

in der


**Öko-Serie der Schieferlehme**

(Mehr als 40 cm kleinsteinig-feinsandige, glimmerführende Lehme, nach unten zunehmend steinig, mit wechselndem Schlufflehmanteil (selten als Feinlehmschicht) über dichtgelagertem Schiefergesteinsschutt oder verfestigtem, steinarmem, glimmrig-sandigem Schieferzersatz)

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen vorwiegend schattseitige Flachlagen, auch Verebnungen und Sattellagen
	<b>Bodentyp</b>	Braunerde
	<b>Humusform</b>	Mullmoder (Mull)
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Asarum europaeum-, Deschampsia flexuosa-, Miliium effusum-, Ajuga reptans - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	keine Vegetationsaufnahmen
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Rotbuche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
<b>Baumarteneignung</b>	geeignet (g)	RBu	1	2	1	1
		TrEi	2	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	Fi	2	3	1	1
	möglich (m)	BAh	2	2	2	2
		Ta	2	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	2	2
		Es	2	2	2	2
	wenig geeignet (w)	Kie	3	3	1	2
	sonstige geeignete Baumart (X)	EKa	-	-	-	-
		REi	-	-	-	-
	sonstige Laubbaumarten	EKa, HBu, REi, Rob, SAh, VKir, WLi				
	sonstige Nadelbaumarten	ELä				
<b>Vorkommen</b>	Fläche der Standortseinheit	23,8 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (1,02 %)				
	Kartierzeitraum	1980-89 - 100 %				
<b>Organisatorisch</b>	Link zur Regionallegende	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_01_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_01_kollin.pdf</a>				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_01_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_01_kollin.pdf</a>				
	Link zur Vegetationsgruppierung	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_01_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_01_kollin.pdf</a>				
	Zugehörige Kartierobjekte	8103				

**Impressum**



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

**Technische Realisierung:**

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)