

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Odenwald

Regionale Einheit

2/01 Grundgebirgs-Odenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

365 (191 bis 525) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

8,8 Ø Temp. / Jahr [°C]

15,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1070 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

465 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

IGSH-

Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenem lehmigem Grus-Sommerhang



h'grün
d'rote Schräggitter

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken

in der

Öko-Serie der lehmigen Grushänge

(Meist mittelgründiger, gut bohrbarer, sandiger Grus, überwiegend lehmiger Grus, stellenweise bis zu grusigem Lehm aus vorherrschend grusiger Kristallinverwitterung (Granite und Rotliegendes), teils steinarm, teils wechselnd steinig, vor allem im Porphyrtuff; örtlich stark lehmig im Oberboden; stellenweise auch mehr als 60 cm lehmiger Grus bis grusiger Lehm)

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Standortseinheiten der steileren Hänge sonseitig exponierte Hänge, i.a. deutliche sommerliche Austrocknung |
| | Bodentyp | podsolige Braunerde, örtlich Braunerde-Podsol |
| | Humusform | Moder |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | mäßig podsolig (O-Ahe) |
| | Rutschgefährdung | Keine Rutschgefährdung |
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | Deschampsia flexuosa-, Vaccinium myrtillus-, (Molinia) - Gruppe |
| | Aufnahmen | keine Vegetationsaufnahmen |
| | Natürliche Waldgesellschaft | |
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Rotbuche, Traubeneiche |
| | Nebenbaumart(en) | |
| | Pionierbaumart(en) | |
| | | |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Baumarteneignung | sonstige Laubbaumarten | - |
| | sonstige Nadelbaumarten | - |
| Vorkommen | Fläche der Standortseinheit | 65,3 ha |
| | Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende | besonders häufig (9,49 %) |
| | Kartierzeitraum | 1980-89 - 100 % |
| Organisatorisch | Link zur Regionallegende | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_01_submontan.pdf |
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_01_submontan.pdf |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_01_submontan.pdf |
| | Zugehörige Kartierobjekte | 8103 |

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, www.idama.de