


**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

<b>Wuchsgebiet</b>	<b>Wuchsbezirk</b>	
Odenwald	2/02 Südwestlicher Buntsandstein-Odenwald	
Standortskundliche Höhenstufe	kollin	
Höhenrahmen [m ü. NN.]	111 bis 448 (Ø 296)	
regionalisierte Klimadaten	Ø 1961-1990	Ø 1991-2020
Ø Temp. / Jahr [°C]	9,8	10,6
Ø Temp. / Sommer (Juni-Aug.) [°C]	17,9	19,0
Σ Niederschlag / Jahr [mm]	895	850
Σ Niederschlag / VZ (Mai-Sept.) [mm]	416	380

fSe

**Schwarzerlen-Eschen-Bergahorn-Wald in feuchten Senken**



d'grün  
blaue Dreiecke ausgefüllt

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe: **Feucht, stellenweise nass**

in der

**Gruppe der Rinnen und Senken**

(Schwach bis stark geneigte Rinnen, Mulden und Talauen mit wechselndem Substrat und Wasserhaushalt; kühles, frisches bis luftfeuchtes Mikroklima, örtlich beeinflusst durch Grund- und Hangwasser; im Bereich des Unteren und Mittleren Buntsandsteins z.T. starke Blockschuttüberlagerungen)

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Sonstige, morphologisch bedingte Standorte
	<b>Bodentyp</b>	Braunerde-Gley
	<b>Humusform</b>	Mull, stellenweise Mullmoder oder Moder
	<b>Basenausstattung</b>	mittel
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	keine Eingabe
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Rubus-, Ajuga reptans-, Impatiens noli-tangere-, Deschampsia cespitosa-, Milium effusum-, (Iris pseudacorus-, Deschampsia flexuosa-, Stachys sylvatica) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	1 Vegetationsaufnahme (2019)
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Schwarzerlen-Eschenwald
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Schwarzerle (Roterle), Gemeine Esche, Bergahorn
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Hainbuche (Weißbuche), Stieleiche
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	Faulbaum

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	möglich (m)	BAh	1	2	2	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Kie	3	3	1	2
	wenig geeignet (w)	Bu	2	2	3	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	TEi	3	2	2	2
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	3
		EKa	3	2	3	3
		REi	3	2	3	3
		Fi	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	Es, REr, SEi				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	1,7 ha.
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,13 %)

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_02_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_02_kollin.pdf</a>
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_02_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_02_kollin.pdf</a>
	Link zur Vegetationsgruppierung	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_02_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_02_kollin.pdf</a>
	Zugehörige Kartierobjekte	10091

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

## Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)