

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Odenwald

**Regionale Einheit**

2/02 Südwestlicher Buntsandstein-Odenwald

**Standortskundliche Höhenstufe**

kollin

**Höhenverbreitung (Wald)**

296 (111 bis 448) m. ü. NN


**Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\***

9,6 Ø Temp. / Jahr [°C]  
16,1 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]  
877 Ø Niederschlag / Jahr [mm]  
410 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**IStH-**

**Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenem lehmigem Steinschutthang**



h'grün  
orange Schräggitter  
schwarze Senkrechtrichelung

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Mäßig trocken**

**in der**


**Öko-Serie der lehmigen Steinschutthänge**

(Stark steiniger, schwer bohrbarer, lehmig-grusiger Hangschutt aus Porphy- und Porphyrtuff-Verwitterung)

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standortseinheiten der steileren Hänge sonenseitige Hänge, schattseitige Oberhänge und Flanken von exponierten Hangrinnen; starke sommerliche Austrocknung
	<b>Bodentyp</b>	podsolige Braunerde
	<b>Humusform</b>	Moder
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	mäßig podsolig (O-Ahe)
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Deschampsia flexuosa-, Miliun effusum-, Vaccinium myrtillus-, (Molinia) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	keine Vegetationsaufnahmen
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Rotbuche, Traubeneiche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
<b>Baumarteneignung</b>	geeignet (g)	TrEi	1	2	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	1	2	1	2
	möglich (m)	Kie	2	3	1	2
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	RBu	1	2	2	3
	ungeeignet (u)	Es	3	2	2	3
		BAh	3	2	2	3
		Fi	3	3	3	3
	<b>sonstige Laubbaumarten</b>	HBu, SaBi, SAh, WLi				
	<b>sonstige Nadelbaumarten</b>	-				
<b>Vorkommen</b>	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	29 ha				
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	besonders häufig (5,43 %)				
	<b>Kartierzeitraum</b>	1980-89 - 100 %				
<b>Organisatorisch</b>	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_02_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_02_kollin.pdf</a>				
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_02_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_02_kollin.pdf</a>				
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_02_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_02_kollin.pdf</a>				
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	8103 (kIStH-), 8303				

**Impressum**



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

**Technische Realisierung:**

IDaMa GmbH, [www.idama.de](http://www.idama.de)