

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Odenwald

Regionale Einheit

2/02 Südwestlicher Buntsandstein-Odenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

365 (112 bis 587) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

8,7 Ø Temp. / Jahr [°C]

15,2 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1065 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

453 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

BID

Traubeneichen-Sommerlinden-Wald auf mäßig frischer Blockschuttdecke



weiß

h'grüne Senkrechtstrichelung

schwarze Dreiecke leer

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch

in der

Gruppe der Block- und Blockschutt-Standorte im Buntsandstein

(Starke Blocküberlagerung in Flachlagen und an Hängen im Mittleren Buntsandstein; am Ober- bis Mittelhang meist über sandig-steinigen bis schwach lehmig-sandigen, steinigen Böden, am Unterhang über sandig-lehmigem Unterboden)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten meist schattseitige Hänge mit eingeschränkter Bestockung bis bestockungsfreie Blockhalden
	Bodentyp	Braunerde, örtlich podsolige Braunerde bis Podsol-Braunerde
	Humusform	Moder, Mullmoder bzw. Spaltenmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	stellenweise mäßig podsolig (O-Ahe)
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Deschampsia flexuosa-, Miliun effusum-, (Vaccinium myrtillus-, Bazzania trilobata-, Impatiens noli-tangere) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Traubeneiche, Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet bis möglich (g/m)	BAh	1	2	1	2
		RBu	1	2	1	2
		TrEi	2	2	1	2
	möglich (m)	Dgl	2	2	2	2
		REi	2	2	1	2
		Fi	2	2	2	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Ta	2	2	2	2
	wenig geeignet (w)	Kie	2	3	1	3
	sonstige Laubbaumarten	BUI, SaBi, SAh, SLi, Vobe, WLi				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit		20,7 ha		
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende		gelegentlich/zerstreut (0,23 %)		
	Kartierzeitraum	1980-89	-	70,1 %	
		1970-79	-	29,9 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_02_submontan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_02_submontan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_02_submontan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	8704 (BL>), 7709 (Bl>), 8206 (Bl>)

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, www.idama.de