

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Odenwald

**Regionale Einheit**

2/03 Kleiner Odenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

311 (112 bis 519) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

8,7 (8-9,7) Ø Temp. / Jahr [°C]

15,2 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1026 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

417 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**MeTM**

**Buchenwald auf mäßig frischem Mergelton-Mischboden**



oliv  
h'grüne Senkrechtstrichelung  
d'braune Punkte

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Mäßig frisch**

in der

**Öko-Serie der nicht vernässenden Mergelton-Mischböden**

(25 bis 60 cm Schlufflehm oder toniger Lehm über mehr oder weniger plastiziertem Mergelton, meist mit allmählichem Übergang; leichte Sickerhemmung im Unterboden möglich)

|                                    |                                    |  |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Morphologie und Boden</b>       | <b>Morphologische Beschreibung</b> | Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen<br>Verebnungen und leicht geneigte Plateaulagen              |
|                                    | <b>Bodentyp</b>                    | Braunerde bis (zweischichtige) Parabraunerde   |
|                                    | <b>Humusform</b>                   | Mull bis Mullmoder   |
|                                    | <b>Basenausstattung</b>            | keine Eingabe  |
|                                    | <b>Podsoligkeit</b>                | ohne Podsoligkeitsmerkmale   |
|                                    | <b>Rutschgefährdung</b>            | Keine Rutschgefährdung   |
| <b>Vegetation</b>                  | <b>Ökologische Artengruppen</b>    | Asarum europaeum-, Milium effusum-, Ajuga reptans-, (Mercurialis perennis-, Stachys sylvatica-, Carex flacca) - Gruppe |
|                                    | <b>Aufnahmen</b>                   | keine Vegetationsaufnahmen   |
|                                    | <b>Natürliche Waldgesellschaft</b> |  |
| <b>Baumarten des Standortswald</b> | <b>Hauptbaumart(en)</b>            | Rotbuche   |
|                                    | <b>Nebenbaumart(en)</b>            |  |
|                                    | <b>Pionierbaumart(en)</b>          |  |
|                                    |                                    |  |

| Baumarteneignung        | Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung |                       |   |   |   |   |
|-------------------------|---|-----------------------|---|---|---|---|
|                         | geeignet bis möglich (g/m)                        | RBu                   | 1 | 2 | 2 | 2 |
|                         | möglich (m)                                       | Es                    | 1 | 2 | 2 | 2 |
|                         |   | TrEi                  | 2 | 2 | 1 | 2 |
|                         | möglich bis wenig geeignet (m/w)                  | Dgl                   | 2 | 2 | 2 | 2 |
|                         |   | BAh                   | 2 | 2 | 2 | 2 |
|                         | wenig geeignet (w)                                | Kie                   | 3 | 3 | 1 | 2 |
|                         |   | Fi                    | 2 | 3 | 3 | 2 |
|                         | sonstige Laubbaumarten                            | Elsbe, HBu, VKir, WLi |   |   |   |   |
| sonstige Nadelbaumarten | -   |                       |   |   |   |   |


  

|           |  |                                 |   |        |  |  |
|-----------|--|---------------------------------|---|--------|--|--|
| Vorkommen | Fläche der Standortseinheit                              | 13 ha                           |   |        |  |  |
|           | Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende | gelegentlich/zerstreut (0,15 %) |   |        |  |  |
|           | Kartierzeitraum  | 1980-89                         | - | 26,7 % |  |  |
|           |  | 1970-79                         | - | 73,3 % |  |  |

|                 |  |   |  |  |  |  |
|-----------------|--|---|--|--|--|--|
| Organisatorisch | Link zur Regionallegende                   | <a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_03_submontan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_03_submontan.pdf</a>       |  |  |  |  |
|                 | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | <a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_03_submontan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_03_submontan.pdf</a>   |  |  |  |  |
|                 | Link zur Vegetationsgruppierung            | <a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_03_submontan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_03_submontan.pdf</a> |  |  |  |  |
|                 | Zugehörige Kartierobjekte                  | 7504, 8401  |  |  |  |  |

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

## Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, [www.idama.de](http://www.idama.de)