

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Odenwald

**Regionale Einheit**

2/03 Kleiner Odenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

311 (112 bis 519) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

8,7 (8-9,7) Ø Temp. / Jahr [°C]

15,2 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1026 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

417 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

Ri+

**Buchen-Bergahorn-Wald in frischen Rinnen und Senken**



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

**Frisch (auch sickerfeucht) randlich auch mäßig frisch, örtlich etwas wechselfeucht**

d'grün

in der

**Gruppe der Rinnen, Mulden, Senken, Hangrinnen und Schluchten**

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten breitere Rinnen, Mulden, Senken und Tallagen
	<b>Bodentyp</b>	(basenreiche) Braunerde bis Gley-Braunerde (kolluvial beeinflusst)
	<b>Humusform</b>	Mull (bis Moder)
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Milium effusum-, Ajuga reptans-, Rubus-, Deschampsia cespitosa-, Urtica dioica-, Deschampsia flexuosa-, (Aruncus dioicus-, Arum maculatum) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	keine Vegetationsaufnahmen
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Waldmeister-Buchenwald mit Frauenfarn; stellenweise Waldmeister-Buchenwald mit Hainsimse; stellenweise Waldmeister-Buchenwald (typisch)
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Rotbuche, Bergahorn
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche), Stieleiche, Traubeneiche
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet bis möglich (g/m)	Es	2	2	1	1
		BAh	2	2	1	1
		RBu	1	2	2	2
	möglich (m)	TrEi	2	2	1	2
		StEi	2	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Fi	2	3	3	1
	wenig geeignet (w)	Dgl	2	2	3	2
	ungeeignet (u)	Kie	3	3	2	3
	sonstige Laubbaumarten	Aspe, BUI, HBu, SAh, WLi				
sonstige Nadelbaumarten	Ta					

Vorkommen	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	218,1 ha			
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	häufig (2,47 %)			
	<b>Kartierzeitraum</b>	1990-99	-	0,2 %	
		1980-89	-	79,5 %	
		1970-79	-	20,3 %	

Organisatorisch	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_03_submontan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_03_submontan.pdf</a>
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_03_submontan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_03_submontan.pdf</a>
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_03_submontan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_03_submontan.pdf</a>
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	8401, 7709 (a), 8704, 10070, 8508 (Se), 7504 (a), 9711 (Se)

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

## Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, [www.idama.de](http://www.idama.de)