

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Odenwald

Regionale Einheit

2/03a1 Westlicher Kleiner Odenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

365 (113 bis 569) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9 Ø Temp. / Jahr [°C]

15,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

962 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

439 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

FLFH+



h'braun

d'grüne Senkrechttgitter

schwarze Fuchsgesicht

Buchenwald auf frischem Feinlehm-Flachhang

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Hangfrisch bis frisch

in der

Öko-Serie der mehr oder weniger sandigen Feinlehm-Flachhänge

(Mehr als 60 cm schwach sandiger bis sandfreier Schlufflehm aus Lösslehm; im tieferen Unterboden und Untergrund Verwitterung des Oberen (und Mittleren) Buntsandsteins, ausnahmsweise auch des Unteren Muschelkalks, örtlich Lössgründigkeit; (deutliche bis starke Sand- und Sandstein-Beimengung mit Sandpunkte-Signatur dargestellt))


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Flachhänge häufig muldige, meist schattseitige Flachlagen; 10077: Schattseitige Flachhänge und Hangfüße
	Bodentyp	Parabraunerde, z.T. schwach pseudovergleyt
	Humusform	Mull, stellenweise Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Milium effusum-, Deschampsia flexuosa-, Galium odoratum-, Rubus-, Urtica dioica-, Deschampsia cespitosa - Gruppe
	Aufnahmen	3 Vegetationsaufnahmen (2018)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldmeister-Buchenwald; Hainsimsen-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughchkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	Es	2	1	1	1
		RBu	1	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	BAh	2	1	2	1
	möglich (m)	Dgl	2	2	2	1
		StEi	3	2	1	1
		Ta	3	2	1	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	TrEi	3	2	1	2
		Fi	3	3	2	1
	wenig geeignet (w)	Kie	3	3	2	1
	sonstige Laubbaumarten	BUI, VKir				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	37,9 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (1,89 %)
	Kartierzeitraum	1970-79 - 100 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_03alpha_submontan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_03alpha_submontan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_03alpha_submontan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	7709

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de