

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Odenwald

Regionale Einheit

2/04 Winterhauch

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

496 (268 bis 626) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,5 Ø Temp. / Jahr [°C]

13,9 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1065 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

naDL

Stieleichen-Buchen-Birken-Wald auf naß-saurem Decklehm



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Ganzjährig, zumindest im Unterboden, vernässt

h'braun
violette Wellenlinien

in der

Öko-Serie der mehr oder weniger vernässenden Decklehme

(Mehr als 60 cm, wechselnd feinsandiger Schlufflehm (aus umgelagertem Lösslehm) mit typisch marmoriertem, dichtem, tonverstärktem Unterboden (mit vereinzelt kleinen Steinen) und mit unterschiedlich deutlichen (auch fehlenden) Staunässezeichen im Oberboden, meist über steinig-sandig-toniger Fließerde des Oberen Buntsandsteins; teilweise auch als Schwemmlehm in ehemaligen Rinnen)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Abflussträge Lagen und Flachsenken
	Bodentyp	Pseudogley bis Stagnogley
	Humusform	Moder bis Rohhumus
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Vaccinium myrtillus-, Molinia-, Deschampsia flexuosa-, Bazzania trilobata-, Carex canescens-, Deschampsia cespitosa - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Birken-Stieleichenwald; selten Birken-Stieleichenwald (typisch)
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Stieleiche, Rotbuche, Sandbirke (Hängebirke), Moorbirke
	Nebenbaumart(en)	Waldkiefer
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Faulbaum, Schwarzerle (Roterle), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughchkeit Sicherheit Leistung					
	möglich (m)	StEi	2	1	1	3
		Kie	1	3	1	2
	wenig geeignet (w)	TrEi	3	2	2	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	RBu	2	2	3	3
	ungeeignet (u)	Dgl	2	2	3	3
		BAh	3	2	3	3
		Fi	2	3	3	3
	sonstige Laubbaumarten	Aspe, SaBi, Vobe				
	sonstige Nadelbaumarten	Ta				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	86,7 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (1,36 %)			
	Kartierzeitraum	1990-99	-	59,8 %	
		1970-79	-	40,2 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_04_montan.pdf			
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_04_montan.pdf			
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_04_montan.pdf			
	Zugehörige Kartierobjekte	9701, 7710, 9711			

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de