

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Odenwald

Regionale Einheit

2/04 Winterhauch

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

387 (133 bis 551) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

8,1 Ø Temp. / Jahr [°C]

14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1024 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

411 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

Se

Buchen-Bergahorn-Wald in frischen Rinnen und Senken



d'grün

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch und mäßig frisch

in der

Gruppe der Rinnen, Bachtäler und Senken

(Rinnen, Mulden und Talauen ohne oder mit ständiger Wasserführung, unterschiedliche Bodenart (Schlufflehm bis Sand), wechselnd steinig, teils tongründig oder mit verfestigten Konkretionshorizonten)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Rinnen, Mulden und Senken
	Bodentyp	Parabraunerde und Braunerde (aus Kolluvium), z.T. im tieferen Unterboden gleyfleckig
	Humusform	Mull bis Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Rubus-, Urtica dioica-, Ajuga reptans-, Deschampsia flexuosa-, (Deschampsia cespitosa-, Stachys sylvatica-, Asarum europaeum-, Molinia-, Iris pseudacorus-, Vaccinium myrtillus) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Buchenwald mit Frauenfarn; stellenweise Waldmeister-Buchenwald mit Frauenfarn; stellenweise Hainsimsen-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	Gemeine Fichte, Hainbuche (Weißbuche), Stieleiche, Traubeneiche
	Pionierbaumart(en)	Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	BAh	1	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	2	2	2	1
	möglich (m)	Dgl	2	2	2	1
		TrEi	3	2	1	2
		Fi	2	2	2	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	StEi	3	2	2	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Kie	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	BUI, Es, HBU, SAh, SEr, WLi				
	sonstige Nadelbaumarten	Ta				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	36,2 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,57 %)
	Kartierzeitraum	2000-09 - 3 %
		1990-99 - 17,2 %
		1980-89 - 79,8 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_04_submontan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_04_submontan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_04_submontan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	8704, 8508, 9711, 8102, 10070, 9926

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de