

Waldstandorte Baden-Württemberg

Wuchsgebiet Regionale Einheit

Odenwald 2/04 Winterhauch

Standortskundliche Höhenstufe submontan

Höhenverbreitung (Wald) 387 (133 bis 551) m. ü. NN

Klimadaten 1961- 8,1 Ø Temp. / Jahr [°C] 1990 (regionalisiert)*

14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C] 1024 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen 411 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

т

Buchen-Eichen-Wald auf mäßig frischem Ton



Standortskundliche Mäßig frisch bis schwach Wasserhaushaltsstufe: wechselfeucht

oliv

in der

Öko-Serie der nicht oder wenig vernässenden Tone

(Feinsandig-schluffiger, z.T. steiniger, plastizierter Ton mit bis zu 30 cm starker steinig-sandiger Lehmauflage oder gesteinsfarbenem tonigem Lehm im Oberboden, z.T. Fließerde-Ton, z.T. Verwitterung von tonigen Schichten des Oberen Buntsandsteins, nur sehr kleinflächig auftretend)

		,			
Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen kleine Kuppen und deren Flanken			
	Bodentyp	zweischichtige Parabraunerde und Pelosol-Braunerde			
	Humusform	Mullmoder bis Moder			
	Basenausstattung	keine Eingabe			
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale			
Σ	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung			
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Deschampsia flexuosa-, (Ajuga reptans-, Milium effusum-, Vaccinium myrtillus) - Gruppe			
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen			
	Natürliche Waldgesellschaft	selten Hainsimsen-Buchenwald			
ımarten des ndortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Stieleiche, Traubeneiche			
	Nebenbaumart(en)	Hainbuche (Weißbuche)			
	Pionierbaumart(en)	Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Waldkiefer			
트입					

STANDORTSEINHEITEN - DATENBLATT



				Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet bis möglich (g/m)		TrEi	2	2	1	2	
			StEi	2	2	1	2	
	möglich (m)		RBu	1	2	2	2	
	möglich bis wenig geeignet	(m/w)	Dgl	2	2	2	2	
	wenig geeignet (w)		BAh	1	2	2	2	
			Kie	3	2	2	3	
			Fi	2	2	3	2	
	sonstige Laubbaumarten	Es, HBu, VKir, WLi						
ш	sonstige Nadelbaumarten		-					
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit 2,3 ha Anteil der Standorteinheit selten (0,04 %)							
	innerhalb der Regionallegende							
	Kartierzeitraum	1980-89	- 1	00 %				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_04_submontan.pdf						
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva- bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_04_submontan.p df						
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_04_submontan.pdf						
	Zugehörige Kartierobjekte	8102						

Impressum

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg Abt. Waldnaturschutz Wonnhaldestr. 4 79100 Freiburg Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortsdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de

Seite 2 von 2 Erstelldatum: 29.09.2020 RST Sort: 325030 RZE: 2/04 submontan

RZST_F: 45532 RST: **T**