

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Odenwald

Regionale Einheit

2/04 Winterhauch

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

387 (133 bis 551) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

8,1 Ø Temp. / Jahr [°C]

14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1024 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

411 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

IsSH-

Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenem lehmig-sandigem Sommerhang



orange
orange Schräggitter
orange Punkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken

in der


Öko-Serie der lehmig-sandigen Steilhänge

(Steile und mäßig steile Hänge im Oberen und Mittleren Buntsandstein mit lehmig-sandigen bis sandig-lehmigen Hangschuttdecken: mehr als 30/40 cm steiniger, auch stark steiniger, lehmiger Sand, auch sandiger Lehm, teilweise mit (verstreuten) Blöcken und großen Steinen, im Unterboden häufig zunehmend schluffig-tonig, über Buntsandsteinhangschutt oder über steinig-sandig-toniger (Hang-) Fließerde)

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Standortseinheiten der steileren Hänge exponierte Oberhänge |
| | Bodentyp | podsolige Braunerde |
| | Humusform | Moder |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | mäßig podsolig (O-Ahe) |
| | Rutschgefährdung | Keine Rutschgefährdung |
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | Deschampsia flexuosa-, Vaccinium myrtillus-, (Leucobryum glaucum) - Gruppe |
| | Aufnahmen | keine Vegetationsaufnahmen |
| | Natürliche Waldgesellschaft | |
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Rotbuche, Traubeneiche |
| | Nebenbaumart(en) | |
| | Pionierbaumart(en) | |

| | | Konkurrenzkraft | Pfleglichkeit | Sicherheit | Leistung | |
|---|--|---|---------------|------------|----------|---|
| Baumarteneignung | geeignet (g) | Kie | 1 | 3 | 1 | |
| | geeignet bis möglich (g/m) | RBu | 1 | 1 | 2 | |
| | möglich (m) | Dgl | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | | TrEi | 2 | 2 | 1 | 3 |
| | wenig- bis ungeeignet (w/u) | Fi | 2 | 3 | 2 | 3 |
| | ungeeignet (u) | BAh | 3 | 2 | 3 | 3 |
| | sonstige Laubbaumarten | SaBi, Vobe | | | | |
| | sonstige Nadelbaumarten | - | | | | |
| | Vorkommen | Fläche der Standortseinheit | 3,2 ha | | | |
| Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende | | selten (0,05 %) | | | | |
| Kartierzeitraum | | 1980-89 - 100 % | | | | |
| Organisatorisch | Link zur Regionallegende | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_04_submontan.pdf | | | | |
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_04_submontan.pdf | | | | |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_04_submontan.pdf | | | | |
| | Zugehörige Kartierobjekte | 8508 | | | | |

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de