

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Odenwald

Regionale Einheit

2/04 Winterhauch

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

387 (133 bis 551) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

8,1 Ø Temp. / Jahr [°C]

14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1024 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

411 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

sFH

Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig frischem sandigem Flachhang (submontan); Buchenwald auf mäßig frischem sandigem Flachhang (montan)



orange
d'braune Senkrechtgitter

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch

in der

Öko-Serie der sandigen Flachhänge

(Flachhänge oberhalb der Steilhänge und im Hangfußbereich: flach- bis tiefgründiger, steiniger bis stark steiniger Sand bis schwach lehmiger Sand aus und über durchlässigem Hangschutt und Verwitterung des Mittleren Buntsandsteins, selten am Oberhang Beimengungen des Plattensandsteins)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Flachhänge Flachhänge
	Bodentyp	podsolige Braunerde und Podsol-Braunerde
	Humusform	Mullmoder bis Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	mäßig podsolig (O-Ahe)
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Deschampsia flexuosa-, Rubus-, Ajuga reptans-, Vaccinium myrtillus-, (Miliun effusum-, Bazzania trilobata) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Buchenwald; selten Hainsimsen-Buchenwald mit Heidelbeere; selten Hainsimsen-Buchenwald (typisch)
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Traubeneiche
	Nebenbaumart(en)	Gemeine Fichte, Weißtanne
	Pionierbaumart(en)	Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Waldkiefer

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	RBu	1	1	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	1	2	1	2
		TrEi	2	2	1	2
		Fi	1	3	1	2
	möglich (m)	Kie	2	3	1	2
	wenig geeignet (w)	BAh	3	1	2	3
	sonstige Laubbaumarten	REi, SaBi, Vobe				
	sonstige Nadelbaumarten	ELä				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	36 ha				
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,56 %)				
	Kartierzeitraum	2000-09	-	87,7 %		
		1980-89	-	12,3 %		

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_04_submontan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_04_submontan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_04_submontan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	9926, 8704				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de