

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Odenwald

Regionale Einheit

2/05a1 Schattseitige Taubertaleinhänge

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

266 (138 bis 381) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

8,4 (8-8,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

15,0 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

685 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

304 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

Se+

Buchen-Bergahorn-Wald in frischen Rinnen und Senken



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Frisch (teilweise grundfrisch) bis mäßig frisch

d'grün

in der

Gruppe der Rinnen, Senken, Mulden und weiteren konkaven Lagen


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Senken, Rinnen und Mulden
	Bodentyp	Braunerde und Parabraunerde (aus Kolluvium), z.T. zweischichtig und im tieferen Unterboden gleyfleckig
	Humusform	Mull bis Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Asarum europaeum-, Urtica dioica-, Milium effusum-, Arum maculatum-, (Deschampsia cespitosa-, Stachys sylvatica) - Gruppe
	Aufnahmen	2 Vegetationsaufnahmen (2009 bis 2012)
	Natürliche Waldgesellschaft	Ahorn-Eschenwald (typisch); Waldmeister-Buchenwald mit Frauenfarn; stellenweise Ahorn-Eschenwald; stellenweise Waldmeister-Buchenwald (typisch)
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	Bergulme, Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche), Stieleiche, Traubeneiche, Vogelkirsche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	BAh	1	2	1	1
		RBu	1	2	1	1
	möglich (m)	Dgl	2	2	2	1
		Es	2	2	1	2
		Ta	2	2	1	2
		Fi	2	2	2	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	StEi	3	2	2	2
	wenig geeignet (w)	TrEi	3	2	2	2
	ungeeignet (u)	Kie	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	Aspe, BUI, HBu, SAh, SEr, VKir, WLi				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	48,6 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (2,95 %)			
	Kartierzeitraum	2010-19	-	56,3 %	
		2000-09	-	1,4 %	
		1980-89	-	42,4 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_05alpha_submontan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_05alpha_submontan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_05alpha_submontan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	8202 (Se), 10018, 10046, 10063, 10001

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de