

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Baar-Wutach

**Regionale Einheit**

5/01 Baar-Schwarzwald

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

854 (631 bis 1034) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

6,3 (5,5-6,8) Ø Temp. / Jahr [°C]  
12,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]  
1175 Ø Niederschlag / Jahr [mm]  
486 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**Mi-**

**Kiefern-Fichten-Wald auf abzugsträgen Missen**



violett

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Nass**

in der

**Gruppe der Missen**

(Gebleichte, sandige bis lehmig-sandige, staunasse und quellig-nasse Verwitterungsdecken des Buntsandsteins mit stauendem, tonigem Unterboden, mit bestimmenden feuchten Rohhumus- und torfigen Feuchthumusaufgaben zwischen 10 und 30 cm)

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen abzugsträge Flachrücken und Plateaulagen mit gehemmtem Abfluss
	<b>Bodentyp</b>	Stagnogley bis Gley-Podsol und Stagnogley-Pseudogley
	<b>Humusform</b>	Rohhumus bis Feuchtrohumus
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	podsoliert (O/Ahe/Ae/B(h)s/...-Profil)
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Vaccinium myrtillus-, Sphagnum-, Deschampsia flexuosa-, Bazzania trilobata-, (Oxycoccus palustris-, Molinia) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	35 Vegetationsaufnahmen (2002 bis 2012)
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Rauschbeeren-Bergkiefern-Moorwald; Rauschbeeren-Geißelmoos-Fichtenwald; selten Beerstrauch-Tannenwald
	<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b> Waldkiefer, Gemeine Fichte
	<b>Nebenbaumart(en)</b> Bergkiefer, Weißtanne	
	<b>Pionierbaumart(en)</b> Aspe (Zitterpappel), Moorbirke, Vogelbeere (Eberesche)	

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughchkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet bis mglich (g/m)	Kie	1	2	1	2
	mglich bis wenig geeignet (m/w)	Fi	1	2	3	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Ta	3	2	2	3
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	3
		BAh	3	2	3	3
		RBu	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	MoBi, Vobe				
	sonstige Nadelbaumarten	-				


  

Vorkommen	Flche der Standortseinheit	171,7 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	hufig (1,45 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	13,2 %		
		2000-09	-	49 %		
		1980-89	-	0,4 %		
	1970-79	-	37,4 %			

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf</a>				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf</a>				
	Link zur Vegetationsgruppierung	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf</a>				
	Zugehrige Kartierobjekte	7715, 9610, 9953, 10025, 9924, 10003, 8405				

**Impressum**



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

**Technische Realisierung:**

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)