

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Baar-Wutach

**Regionale Einheit**

5/01 Baar-Schwarzwald

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

854 (631 bis 1034) m. ü. NN

Klima 1961-1990 (regionalisiert)

6,3 Ø Temp. / Jahr [°C]

12,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1175 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

486 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**Rü-**

**Tannen-Fichten-Kiefern-Wald auf mäßig trockenen Rücken und Hangrücken**



d'gelb  
orange Senkrechtstriche

**Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe** Mäßig trocken bis trocken

**in der**

**Gruppe der Rücken und Hangrücken im Grundgebirge**

(Exponierte Rückenlagen bis etwa 60 m Breite mit starkem seitlichem Wasserzug; örtlich blockig oder felsig)

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Rücken und Hangrücken, meist blockig und felsig
	<b>Bodentyp</b>	Ranker bis Braunerde, örtlich podsolige bis podsolierte Braunerde
	<b>Humusform</b>	Moder bis Rohhumus, örtlich Hagerhumus
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	stellenweise mäßig podsolig (O-Ahe)
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Vaccinium myrtillus-, Deschampsia flexuosa-, (Leucobryum glaucum) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	keine Vegetationsaufnahmen
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Beerstrauch-Tannenwald mit Kiefer und Weißmoos
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Weißtanne, Gemeine Fichte, Waldkiefer
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Rotbuche
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	Aspe (Zitterpappel), Bergahorn, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung			Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung
	geeignet bis möglich (g/m)	Kie	1	3	1	2
	möglich (m)	Dgl	1	2	2	2
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	RBu	1	1	2	3
	möglich bis weniger geeignet (m/w)	Ta	2	2	2	3
	weniger geeignet (w)	Fi	2	3	2	3
	weniger- bis ungeeignet (w/u)	BAh	3	1	3	3
	sonstige Laubbaumarten	SaBi				
	sonstige Nadelbaumarten	-				


  

Vorkommen	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	0,4 ha
	<b>Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende</b>	sehr selten (0 %)
	<b>Kartierzeitraum</b>	2010-19 - 100 %

Organisatorisch	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf">http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf</a>
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf">http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf</a>
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf">http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf</a>
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	10025

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesbetrieb ForstBW

## Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)