

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/01 Baar-Schwarzwald

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

854 (631 bis 1034) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,3 (5,5-6,8) Ø Temp. / Jahr [°C]


12,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1175 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

486 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

gfKb



Tannenwald auf grundfeuchtem Kristallinboden

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Grundfrisch bis grundfeucht, örtlich auch wechselfeucht

h'grün
d'grüne Wellenlinien

in der

Öko-Serie der mehr oder weniger vernässenden Kristallinböden

(Lehmig-grusige Verwitterungsdecken des Kristallin mit Tonanreicherung im Untergrund; wechselnd starke Staunässezeichen; häufig im Übergangsbereich Grundgebirge/Buntsandstein)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen und hangfußartige Verebnungen
	Bodentyp	Pseudogley-Braunerde bis Braunerde-Pseudogley und Gley-Braunerde
	Humusform	Mullmoder bis Moder, z.T. Feuchthumus, örtlich anmoorig
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Milium effusum-, Deschampsia flexuosa-, Vaccinium myrtillus-, Stachys sylvatica-, (Sphagnum-, Impatiens noli-tangere-, Bazzania trilobata) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Beerstrauch-Tannenwald; Hainsimsen-Fichten-Tannenwald; stellenweise Beerstrauch-Tannenwald mit Frauenfarn; stellenweise Hainsimsen-Fichten-Tannenwald mit Frauenfarn
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Gemeine Fichte, Rotbuche
	Pionierbaumart(en)	Gemeine Esche, Sandbirke (Hängebirke), Schwarzerle (Roterle), Vogelbeere (Eberesche), Waldkiefer

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughchkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	Ta	1	2	1	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	RBu	2	1	3	2
		Kie	2	3	2	2
		Fi	2	3	3	1
	wenig geeignet (w)	Dgl	2	2	3	2
		BAh	3	2	2	2
	sonstige Laubbaumarten	Es, SEr, Vobe				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	10 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	selten (0,08 %)			
	Kartierzeitraum	2010-19	-	34,3 %	
		2000-09	-	65,7 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf			
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf			
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf			
	Zugehörige Kartierobjekte	9953, 10025			

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de